

Nervosol K, krople uspakajające, 35 g



Cena: 11,00 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	35 g
Opakowanie	35 g
Postać	płyn doustny
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Guttae sedativae

Opis produktu

Wskazania

Łagodne stany napięcia nerwowego.

Działanie

Uspakajające.

Dawkowanie

- Doustnie.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1-3 razy na dobę dawka jednorazowa 2-5 ml płynu (co odpowiada 44-110 kropli lub około 1/2-1 łyżeczki płynu).
- Nie zaleca się przyjmowania dłuższego niż 7 dni.

Skład

1 ml (970 mg) płynu zawiera 1 ml wyciągu złożonego (1:2) z Valeriana officinalis L. radix (korzeń kozłka), Melissa officinalis L. herba (ziele melisy), Angelica archangelica L. radix (korzeń arcydzięgla), Humulus lupulus L. flos (szyszka chmielu), Lavandula angustifolia Miller, flos (5:5:4:3:3), ekstrahent: etanol 60% (V/V).

Zawartość etanolu w produkcie 50%-57% (V/V)

5 ml preparatu (1 łyżeczka) odpowiada dawce 0,375 g Lupuli flore i 0,625 g Valerianae radice

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którykolwiek składnik produktu.
- Nie podawać dzieciom poniżej 12 lat.
- Nie zaleca się przyjmowania dłużej niż 7 dni.

Działania niepożądane

W pojedynczych przypadkach możliwe jest wystąpienie nadwrażliwości skóry na światło słoneczne.

Przechowywanie

W zamkniętych opakowaniach, w temp. nie wyższej niż 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Po zastosowaniu leku należy unikać ekspozycji na światło słoneczne.
- Lek zawiera 50-57% (V/V) etanolu (alkohol). Jednorazowa dawka 5 ml zawiera 2,25 g etanolu, co odpowiada 57 ml piwa lub 24 ml wina, natomiast dawka jednorazowa 2 ml zawiera 0,9 g etanolu, co odpowiada 22,8 ml piwa lub 9,6 ml wina.
- Nie zaleca się stosowania produktu u osób z chorobą alkoholową, z chorobą wątroby lub z padaczką.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.