

Nervosol Tabs 100 mg + 32 mg, 30 tabletek powlekanych



Cena: 17,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg + 32 mg
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	WROCLAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Valerianae radicis extractum siccum, Lupuli strobilus

Opis produktu

Wskazania

Łagodne stany napięcia nerwowego i trudnościach w zasypianiu.

Działanie

- Uspakajające.
- Nasenne.

Dawkowanie

- Doustnie, popić wodą.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: w łagodnych stanach napięcia nerwowego 3 razy na dobę 2 tabletki powlekane. W przypadku trudności w zasypianiu jako lek wspomagający sen na godzinę przed udaniem się na spoczynek 2 tabletki powlekane.
- Jeżeli w czasie stosowania leku objawy nie ustępują i utrzymują się dłużej niż 4 tygodnie, należy skonsultować się z lekarzem.
- Maksymalna dawka dobowa leku to 6 tabletek.

Skład

Substancje czynne: wyciąg wodno-alkoholowy suchy z korzenia kozłka (Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum), wyciąg suchy z szyszek chmielu (Lupuli floris extractum siccum).

100 mg wyciągu wodno-alkoholowego (jako wyciąg suchy) z Valeriana officinalis L.s.l., radix (korzeń kozłka) (3 – 6 : 1), ekstrahent: etanol (70% V/V) i 32 mg wyciągu (jako wyciąg suchy) z Humulus lupulus L., flos (szyszki chmielu) (4 – 8 : 1), ekstrahent: etanol (40% V/V).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: glukoza ciekła suszona rozpyłowo, lecytyna sojowa, czerwieni allura AC lak glinowy (E129). Pozostałe składniki to: krzemionka koloidalna bezwodna, maltodekstryna, celuloza mikrokrystaliczna z dodatkiem krzemionki koloidalnej bezwodnej, magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, otoczka Opadry II (alkohol poliwinylowy, talk, tytanu dwutlenek E171, makrogol 3350, indygotyny lak glinowy (E132)).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na substancje czynne (suche wyciągi z korzenia kozłka i szyszek chmielu) i rośliny z rodzin kozłkowate (Valerianaceae) i konopiowate (Cannabaceae) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Podczas stosowania leku mogą wystąpić zaburzenia żołądka i jelit: nudności, skurczowe bóle brzucha - częstość nieznana.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

U pacjentów z nietolerancją niektórych cukrów - po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.