

Nifuroksazyd Gedeon Richter 200 mg, 12 kapsułek twardych



Cena: 7,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	12 kapsułek twardych
Postać	kapsułki twarde
Producent	GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Nifuroksazyd

Opis produktu

Opis

Nifuroksazyd Gedeon Richter, lek w postaci kapsułek jest lekiem przeciwbakteryjnym wykazującym miejscowe działanie w świetle jelita w stosunku do niektórych gatunków bakterii. Nifuroksazyd Gedeon Richter nie niszczy niechorobotwórczych bakterii występujących prawidłowo w przewodzie pokarmowym. Nie powoduje powstania szczepów bakterii opornych na jego działanie. Po podaniu doustnym praktycznie nie wchłania się z przewodu pokarmowego. Wydalany jest w postaci niezmięnionej z kałem.

Wskazania

- Ostre i przewlekłe biegunki pochodzenia bakteryjnego.
- Inne schorzenia przebiegające z biegunką.

Działanie

Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

- Zazwyczaj stosowana u dorosłych i dzieci w wieku od 7 lat dawka to 1 kapsułka przyjmowana 4 razy na dobę, co 6 godzin.
- Stosować doustnie, kapsułkę połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu, na przykład szklanką wody.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
- Podczas leczenia biegunek lekiem Nifuroksazyd Gedeon Richter konieczne jest stałe nawadnianie organizmu, należy więc przyjmować duże ilości płynów, najlepiej wody, słodkich lub aromatyzowanych napojów (średnie spożycie wody dla pacjenta dorosłego – 2 litry na dobę).

Skład

Substancja czynna: nifuroksazyd.

Pozostałe składniki: skrobia kukurydziana, skrobia żelowana kukurydziana, sacharoza, magnezu stearynian, żelatyna, żelaza tlenek żółty, tytanu dwutlenek.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na nifuroksazyd lub którykolwiek z pozostałych składników leku. Reakcja alergiczna może się objawiać: spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem).
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ dzieci w tym wieku mogą mieć trudności z połknięciem kapsułki.

Działania niepożądane

- Nie obserwowano ciężkich, zagrażających życiu działań niepożądanych po zażyciu leku z wyjątkiem jednego przypadku granulocytopenii (zmniejszenia liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów).
- W indywidualnych przypadkach reakcji uczuleniowej na nifuroksazyd mogą wystąpić następujące działania niepożądane: bóle brzucha, nudności, nasilenie biegunki.
- Ponadto rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane (u co najmniej 1 na 10000, ale rzadziej niż 1 na 1000 pacjentów): wysypka, krosty na skórze, swędzenie i guzki na skórze.
- Z częstością nieznaną (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych) mogą wystąpić: reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.