

# Nifuroksazyd Hasco 100 mg, 24 tabletki powlekane



Cena: 8,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	100 mg
Opakowanie	24 tabletki powlekane
Postać	tabletki powlekane
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Nifuroxazidum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

### Działanie

Przeciwbakteryjne wobec większości bakterii wywołujących zakażenia jelitowe. Lek działa na ziarniaki Gram-dodatnie z rodzaju Staphylococcus i Streptococcus oraz drobnoustroje Gram-ujemne (Salmonella, Shigella, Klebsiella, Escherichia).

### Dawkowanie

- Lek stosuje się doustnie.
- Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

### Skład

1 tabletki powlekana zawiera:

Substancje czynne: Nifuroksazyd (Nifuroxazidum) 100 mg,

Substancje pomocnicze: Skrobia ziemniaczana, powidon, magnezu stearynian. Skład otoczki (Opadry II HP 85F22064 Yellow): alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, lak aluminiowy żółcieni chinolinowej E104, talk, tytanu dwutlenek, żółcień pomarańczowa E110, lak aluminiowy indygoarminy E132.

### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.

### Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

### Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Podczas leczenia niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów.
- Jeśli biegunka utrzymuje się po 2 lub 3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
- Lek należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw.
- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.
- Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i podczas karmienia piersią.
- Lek uważany jest za bezpieczny i nie powoduje upośledzenia sprawności psychofizycznej, zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi urządzeń mechanicznych będących w ruchu.
- Spożywanie alkoholu w trakcie leczenia może wywołać reakcję objawiającą się nasiloną biegunką, wymiotami, bólem brzucha.

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.