

Nifuroksazyd Polfarmex 200 mg, 20 tabletek powlekanych



Cena: 11,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	20 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	POLFARMEX S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Nifuroksazydum

Opis produktu

Wskazania

Ostra lub przewlekła biegunka w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego u dorosłych i dzieci powyżej 7 lat.

Działanie

Przeciwbakteryjne, przeciwbiegunkowe.

Dawkowanie

- Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 7 lat to 2 tabletki przyjmowane 4 razy na dobę, co 6 godzin.
- Dorośli: 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Dzieci w wieku powyżej 7 lat: 600-800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
- Nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie stosować dłużej niż 7 dni.
- Lek stosuje się doustnie. Tabletki należy połknąć w całości, popijając je odpowiednią ilością płynu (szklanka wody). Tabletki nie należy przegryzać, ani kruszyć.

Skład

Substancją czynną leku jest nifuroksazyd (Nifuroksazydum).
1 tabletkę zawiera 200 mg nifuroksazydu.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na nifuroksazyd, pochodne 5-nitrofuranu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Reakcja uczuleniowa może się objawiać wysypką, spuchnięciem twarzy, warg, języka lub dusznością, splątaniem, bledzią skóry, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem (w przypadku wystąpienia takich objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem).
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat, ponieważ dzieci w tym wieku mogą mieć trudności z połknięciem tabletki.

Działania niepożądane

- Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych: reakcje alergiczne np. reakcje skórne; wysypka, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (objawiające się spuchnięciem twarzy, warg, języka, dusznością); wstrząs anafilaktyczny (objawiający się splątaniem, blednością skóry, przyspieszonym oddechem, osłabieniem i omdleniem).
- Rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów): wysypka; krosty na skórze.
- Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych): granulocytopenia (zmniejszenia liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów); świerzbączka guzkowa w przebiegu alergii kontaktowej na nifuroksazyd; bóle brzucha; nudności; nasilenie biegunki.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.