

## NiQuitin Mini 4mg, tabletki do ssania, 20 tabletek do ssania



Cena: 65,98 zł

### Opis słownikowy

Dawka	4 mg
Opakowanie	20 tabletek do ssania
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Nicotinum

### Opis produktu

#### Opis

NiQuitin Mini to tabletki do ssania, stosowane wspomagająco w leczeniu uzależnienia od tytoniu. Stosowanie tabletek zmniejsza chęć zapalenia papierosa, łagodzi objawy odstawienia, a w rezultacie toruje drogę do trwałego uwolnienia się od tytoniu. Poręczne opakowanie NiQuitin Mini zawiera 20 tabletek do ssania z nikotyną. Tabletki, w odróżnieniu od tytoniu nie zawierają szkodliwych substancji smolistych, tlenku węgla oraz dziesiątek innych związków chemicznych niekorzystnie wpływających na zdrowie. Tabletki skutecznie redukują chęć sięgnięcia po papierosa.

#### Wskazania

Wspomaganie rzucenia palenia.

#### Działanie

Łagodzenie objawów wynikających z odstawienia nikotyny.

#### Dawkowanie

- Tabletki do ssania umieścić w jamie ustnej i co pewien czas przemieszczać ją z jednej strony jamy ustnej na drugą, do czasu całkowitego rozpuszczenia (ok. 10 min). W tym czasie uwalniana nikotyna wchłania się do organizmu przez śluzówkę jamy ustnej.
- Podczas ssania tabletek nie należy jeść ani pić.
- Po rozpoczęciu terapii należy starać się zaprzestania przyjmowania tytoniu.
- Moc produktu należy dobrać zależnie od ilości wypalanych papierosów dziennie. NiQuitin Mini 4 mg jest zalecany osobom, którzy wypalają więcej niż 20 papierosów dziennie. Jeśli liczba wypalanych papierosów jest niższa, należy wybrać NiQuitin Mini 1,5 mg.
- Zalecane jest stosowanie zazwyczaj 8-12 tabletek na dobę. Nie należy stosować więcej niż 15 tabletek na dobę.
- Należy stosować lek przez okres 6 tygodni, aby przełamać nawyk palenia, a następnie stopniowo ograniczać ilość przyjmowanych tabletek. Leczenie należy przerwać, kiedy codzienne spożycie wynosi 1-2 tabletki.

- Aby móc powstrzymać się od palenia po zakończeniu kuracji, tabletki można stosować kiedy pojawia się silna ochota na zapalenie papierosa.
- Pacjenci stosujący lek dłużej niż 9 miesięcy powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

#### Skład

1 tabletkę do ssania zawiera jako substancję czynną 4 mg nikotyny (w postaci nikotyny z kationem) oraz substancje pomocnicze. Substancje pomocnicze: mannitol, sodu alginian, guma ksantan, potasu wodorowęglan, wapnia polikarbo?l, sodu węglan bezwodny, acesulfam potasowy, magnezu stearynian, aromat mentolowy 020184, aromat mięty pieprzowej 022173, aromat korygujący smak 031431

#### Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na nikotynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu,
- Dzieci i młodzieży w wieku poniżej 12 lat,
- Osoby niepalące.

#### Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze otoczenia.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek może być stosowany przez młodzież w wieku 12-17 lat jedynie ze wskazania lekarza lub farmaceuty.
- Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności leku w tej grupie wiekowej.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.