

# Nizoral 20 mg/ g, krem, 30 g



Cena: 34,23 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 g
Dawka	20 mg/ g
Opakowanie	30 g
Postać	krem
Producent	MCNEIL PRODUCTS LIMITED C/O JOHNSON & JOHNSON LTD
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ketoconazolum

## Opis produktu

### Opis

Lek Nizoral w postaci kremu to lek o silnym działaniu przeciwgrzybiczym do miejscowego leczenia grzybicy skóry tułowia, rąk, stóp i pachwin oraz łojotokowego zapalenia skóry. Nizoral, krem przeznaczony jest do stosowania na skórę u osób dorosłych.

### Wskazania

- Miejscowe leczenie grzybicy skóry tułowia, pachwin, rąk i stóp wywołanych następującymi dermatofitami: *Trichophyton rubrum*, *Trichophyton mentagrophytes*, *Microsporum canis*, *Epidermophyton floccosum*, a także drożdżycy skóry i łupieżu pstrego (*Pityriasis versicolor*).
- Leczenie łojotokowego zapalenia skóry, związanego z obecnością drożdżaka *Malassezia ovale* (*Pityrosporum ovale*).

### Działanie

Przeciwgrzybicze.

### Dawkowanie

Drożdżycza skóry, grzybica tułowia, pachwin, grzybica rąk i stóp, łupież pstry (*Pityriasis versicolor*): nanosić lek Nizoral, krem na chorobowo zmienione miejsca na skórze oraz skórę bezpośrednio do nich przylegającą raz na dobę.

Średni czas trwania leczenia:

- łupież pstry: 2 do 3 tygodni,
- drożdżycza skóry: 2 do 3 tygodni,
- grzybica pachwin: 2 do 4 tygodni,
- grzybica tułowia: 3 do 4 tygodni,
- grzybica stóp: 4 do 6 tygodni.

Łojotokowe zapalenie skóry: w zakażeniach skóry objawiających się brązowo-czerwonymi plamami lub białymi i żółtymi łuskami (łojotokowe zapalenie skóry) lek Nizoral, krem należy stosować raz lub dwa razy na dobę. Objawy zakażenia ustępują zwykle po 2-4 tygodniach.

Zwykle poprawa jest widoczna po 4 tygodniach leczenia. W razie braku poprawy należy skontaktować się z lekarzem.

Lek należy stosować jeszcze przez kilka dni po całkowitym ustąpieniu objawów zakażenia.

Nawet po całkowitym wyleczeniu, aby zapobiec nawrotom choroby, pacjent powinien stosować lek Nizoral, krem raz w tygodniu lub raz na 2 tygodnie.

W trakcie leczenia, aby zapobiec powtórnemu zakażeniu, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny.

### Skład

Substancja czynna: ketokonazol. 1 g kremu zawiera 20 mg ketokonazolu.

Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, alkohol stearylowy, alkohol cetylowy, sorbitanu stearynian, polisorbat 60, izopropylu myrystynian, sodu siarczyny bezwodny (E 221), polisorbat 80, woda oczyszczona.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na ketokonazol lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Działania niepożądane

- Często (u więcej niż 1 na 100 i u mniej niż 1 na 10 pacjentów) występujące działania niepożądane: rumień i świąd w miejscu podania, uczucie pieczenia skóry.
- Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 i u mniej niż 1 na 100 pacjentów) występujące działania niepożądane: krwawienia w miejscu podania, uczucie dyskomfortu i suchości, podrażnienie, stan zapalny, parestezje (nieprzyjemne wrażenie mrowienia, drętwienia lub zmian temperatury skóry, tj. uczucie silnego gorąca lub zimna), reakcje w miejscu podania, nadwrażliwość, zmiany pęcherzowe, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka, łuszczenie i lepkość skóry.
- Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) występujące działanie niepożądane: pokrzywka.

### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy unikać kontaktu leku z oczami,
- W przypadku uprzedniego, miejscowego leczenia łojotokowego zapalenia skóry kortykosteroidami, przed zastosowaniem leku Nizoral, krem, należy stopniowo – w ciągu 2 tygodni – wycofywać się z leczenia kortykosteroidami, gdyż w przypadku nagłego zaprzestania ich stosowania obserwowano nasilenie objawów choroby,
- Pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku,
- W okresie ciąży i karmienia piersią lek Nizoral, krem można stosować tylko wtedy, gdy stosowanie leku zaleci lekarz, gdyż nie ma danych dotyczących,
- Lek Nizoral, krem zawiera glikol propylenowy, alkohol cetylowy i alkohol stearylowy,
- Lek zawiera 200 mg glikolu propylenowego w każdym 1 g kremu. Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Ze względu na zawartość substancji pomocniczych – alkoholu cetylowego i stearylowego lek może powodować miejscową reakcję skórną (np. kontaktowe zapalenie skóry).

### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.