

# No-Spa 40 mg, 20 tabletek

Cena: 15,95 zł



## Opis słownikowy

Dawka	40 mg
Opakowanie	20 tabletek
Producent	SANOFI AVENTIS SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum

## Opis produktu

### Opis

Lek No-Spa zawiera jako substancję czynną chlorowoderek drotaweryny, która jest stosowana w skurczu mięśni gładkich pochodzenia zarówno nerwowego jak i mięśniowego. Działanie rozkurczające drotaweryny nie zależy od rodzaju unerwienia oraz lokalizacji mięśni gładkich (przewód pokarmowy, układ moczowo-płciowy, układ krążenia oraz drogi żółciowe). Lek jest metabolizowany w wątrobie, wydalany jest głównie z moczem i w mniejszym stopniu przez przewód pokarmowy.

### Wskazania

- W stanach skurczowych mięśni gładkich związanych z chorobami dróg żółciowych: kamicą dróg żółciowych, zapaleniem pęcherzyka żółciowego, zapaleniem okołopęcherzykowym, zapaleniem przewodów żółciowych, zapaleniem brodawki Vatera.
- W stanach skurczowych mięśni gładkich dróg moczowych: kamica nerkowa, kamica moczowodowa, zapalenie miedniczek nerkowych, zapalenie pęcherza moczowego, bolesne parcie na mocz

### Wspomagająco:

- W stanach skurczowych mięśni gładkich przewodu pokarmowego: chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, zapaleniu żołądka, zapaleniu jelit, zapaleniu okrężnicy, w stanach skurczowych wpustu i odźwiernika żołądka, zespole drażliwego jelita grubego, zaparciach na tle spastycznym i wzdęciach jelit, zapaleniu trzustki
- W schorzeniach ginekologicznych: bolesnym miesiączkowaniu.

### Działanie

Rozkurczowe.

### Dawkowanie

- Dorośli: dawka dobową: 120 do 240 mg, w 2 - 3 dawkach podzielonych.
- W przypadku konieczności zastosowania leku No-Spa u dzieci: dawka dobową dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat: wynosi 80 mg,

w 2 dawkach podzielonych. Dawka dobową dla dzieci w wieku powyżej 12 lat: wynosi 160 mg, w 2 - 4 dawkach podzielonych.

#### Skład

Każda tabletkę zawiera jako substancje czynne: drotawerynę (w postaci chlorowodoru) 40 mg oraz substancje pomocnicze w tym laktozę jednowodną.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca.
- Jeśli pacjent ma blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.
- Dzieci poniżej 6 lat.

#### Działania niepożądane

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 osoby na 1000): reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, świąd), ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, nudności, zaparcie.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić przed światłem.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedociśnieniem, u dzieci, u kobiet w ciąży.
- Nie stosować leku w czasie porodu.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.