

No-Spa Max 80 mg, 20 tabletek powlekanych

Cena: 24,95 zł



Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	20 tabletek powlekanych
Producent	CHINOIN PHARMACEUTICAL AND CHEMICAL WORKS PRIVATE CO. LTD.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Drotaverinum

Opis produktu

Opis

Lek No-Spa Max, to lek w postaci tabletek powlekanych wydawany bez recepty. Działa na szerokie spektrum dolegliwości w obrębie jamy brzusznej. Dzięki zawartości podwójnej dawki drotaweryny działa silnie rozkurczowo, uwalniając od uczucia napięcia i bólu brzucha. Powlekana tabletką nie pozostawia posmaku goryczy na języku. Łagodzi skurcz, przez co także dolegliwości bólowe w chorobach dróg moczowych i żółciowych, chorobie wrzodowej żołądka, czy zaparciach na tle spastycznym. Może być bezpiecznie stosowana w niektórych chorobach jelit, na przykład zespole jelita nadwrażliwego jako leczenie wspomagające. Działa wspomagająco w bolesnym miesiączkowaniu. Działa już po 15 minutach.

Wskazania

Różnego rodzaju skurczowe bóle brzucha w: kamicy dróg żółciowych, kamicy nerkowej, zapaleniu żołądka i jelit, bolesnym miesiączkowaniu.

Działanie

Rozkurczowe.

Dawkowanie

- Dorośli: 1 tabletkę powlekana 2 lub 3 razy na dobę; dawka dobową wynosi 120 do 240 mg.
- W przypadku konieczności zastosowania produktu leczniczego No-Spa Max 80 mg u dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletkę powlekana 1 lub 2 razy na dobę; maksymalna dawka dobową dla dzieci wynosi 160 mg. Bez konsultacji z lekarzem produkt leczniczy może być stosowany maksymalnie przez 7 dni.

Skład

Każda tabletkę powlekana zawiera 80 mg drotaweryny chlorowodoru oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę jednowodną oraz żółcień chinolinową lak (E 104)

Przeciwwskazania

- Uczulenie na drotawerynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Ciężka niewydolność wątroby, nerek i serca.
- Jeśli u pacjenta występuje blok przedsionkowo-komorowy II-III stopnia.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Działania niepożądane

Rzadko (mogą dotyczyć 1 na 1000 pacjentów): reakcje alergiczne (obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, wysypka, swędzenie), ból i zawroty głowy, bezsenność, kołatanie serca, zmniejszenie ciśnienia krwi, nudności, zaparcie.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z niedociśnieniem i u kobiet w ciąży.
- Ze względu na obecność żółtocieni chinolinowej lek może powodować reakcje alergiczne.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Drotaweryna przechodzi przez łożysko. Nie stosować leku w czasie porodu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.