

Nolpaza control 20 mg, 14 tabletek dojelitowych

Cena: 9,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	20 mg
Opakowanie	14 tabletek dojelitowych
Producent	KRKA D.D. NOVO MESTO
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Pantoprazolum

UWALNIA OD ZGAGI | 14 TABL.

Opis produktu

Wskazania

Do krótkotrwałego leczenia objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej).

Działanie

Lek zmniejsza ilość kwasu w żołądku.

Dawkowanie

- Zalecana dawka to 1 tabletkę na dobę. Nie należy stosować dawki dobowej większej niż 20 mg.
- Lek należy przyjmować przynajmniej przez 2-3 kolejne dni. Należy zakończyć stosowanie leku Nolpaza control po całkowitym ustąpieniu objawów. Możliwe jest złagodzenie objawów refluksu i zgagi już po jednym dniu stosowania leku Nolpaza control, lecz należy pamiętać, że lek ten nie jest przeznaczony do natychmiastowego usuwania objawów.
- Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli objawy nie ustąpią po stosowaniu tego leku przez pełne 2 tygodnie.
- Nie należy przyjmować leku Nolpaza control przez dłużej niż 4 tygodnie bez konsultacji z lekarzem.
- Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać w całości, nie rozgryzać i nie dzielić, obficie popijając wodą.

Skład

Każda tabletkę dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (Pantoprazolum) (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletkę dojelitowa zawiera 18 mg sorbitolu.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
- Stosowanie inhibitorów proteazy HIV, których wchłanianie zależy od pH kwasu solnego w żołądku, takich jak atazanawir czy nelfinawir, jednocześnie z pantoprazolem jest przeciwwskazane z powodu znacznego ograniczenia ich biodostępności przez pantoprazol.

Działania niepożądane

Należy natychmiast poinformować lekarza lub skontaktować się z najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi jakiegokolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych:

- Ciężkie reakcje alergiczne (rzadko): Reakcje nadwrażliwości, tak zwane reakcje anafilaktyczne, wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy. Typowe objawy to: obrzęk twarzy, warg, ust, języka i (lub) gardła, który może powodować trudności w przełykaniu lub oddychaniu, pokrzywka, silne zawroty głowy z przyspieszonym biciem serca i obfitym poceniem się.
- Ciężkie reakcje skórne (częstość nieznana): wysypka z obrzękiem, pęcherzami lub łuszczeniem się skóry, płatowe łuszczenie się skóry, krwawienie z okolic oczu, nosa, ust lub narządów płciowych oraz szybkie pogarszanie się stanu ogólnego, lub wysypka po ekspozycji na słońce.
- Inne ciężkie reakcje (częstość nieznana): zażółcenie skóry i białkówki oczu (spowodowane ciężkim uszkodzeniem wątroby), problemy z nerkami przejawiające się bolesnym oddawaniem moczu, bólem w dolnej części pleców z towarzyszącą gorączką.
- Niezbyt często (od 1 do 10 na 1000 leczonych pacjentów): ból głowy, zawroty głowy, biegunka, nudności, wymioty, wzdęcia i wzdęcia z oddawaniem gazów, zaparcia, suchość w jamie ustnej; ból i dyskomfort w obrębie brzucha, wysypka skórna lub pokrzywka, swędzenie skóry, osłabienie, wyczerpanie lub złe samopoczucie, zaburzenia snu; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych w badaniu krwi.
- Rzadko (od 1 do 10 na 10 000 leczonych pacjentów): zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, bóle stawów, bóle mięśni, zmiany masy ciała, podwyższona temperatura ciała, obrzęk kończyn, reakcje alergiczne, depresja, zwiększone stężenie bilirubiny i lipidów we krwi (stwierdzone w badaniach krwi).
- Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10 000 leczonych pacjentów): zaburzenia orientacji, zmniejszenie liczby płytek krwi, co może powodować zwiększoną skłonność do krwawień i tworzenia się wybroczyn na skórze („siniaków”); zmniejszenie liczby białych krwinek, co może sprzyjać częstszym zakażeniom.
- Częstość nieznana: omamy; splątanie (szczególnie u pacjentów, u których występowały takie objawy), zmniejszenie stężenia sodu we krwi obniżenie poziomu magnezu we krwi.
- Jeżeli przyjmowano Nolpaza control przez okres dłuższy niż trzy miesiące, istnieje możliwość, zmniejszenia stężenia magnezu we krwi. Małe stężenie magnezu może objawiać się jako zmęczenie, mimowolne skurcze mięśni, dezorientacja, drgawki, zawroty głowy, przyspieszona akcja serca. W razie zaobserwowania któregoś z powyższych objawów, należy o tym niezwłocznie poinformować lekarza. Małe stężenie magnezu może prowadzić do zmniejszenia stężenia potasu lub wapnia we krwi. Lekarz może zalecić regularne przeprowadzanie badań krwi w celu kontrolowania stężenia magnezu.

Przechowywanie

W sposób niedostępny dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Galeria



Nolpaza[®] control 20 mg

Nolpaza control oferuje pełną kontrolę zgagi przez 24 godziny z 1 małą tabletką dziennie^(1,2)

24HR

Nolpaza[®] control 20 mg

WYSOKI profil bezpieczeństwa

Pantoprazol nie wykazuje interakcji z kofeiną⁽¹⁾

NISKI potencjał interakcji z innymi lekami⁽¹⁾

Długotrwała ulga od zgagi

- 1 mała tabletką dziennie
- 24 godzinna kontrola
- Bez glutenu

Łagodzi objawy zgagi
Działa przez 24 godziny
Wystarczy 1 tabletką dziennie

Nolpaza[®] control 20 mg

Mała ulga od zgagi. 24 godzinna kontrola. Bez glutenu.

1. Chondropolska Polska Farmacja NLP. Nolpaza control 20 mg. 2014. 2. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 3. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 4. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 5. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 6. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 7. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 8. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 9. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014. 10. Sphibon. Control 24 godzinna kontrola zgagi. 2014.