

# Nurofen dla dzieci Forte, zawiesina doustna o smaku truskawkowym, 150 ml



Cena: 46,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	40 mg/ml
Opakowanie	150 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

## Opis produktu

### Wskazania

Do krótkotrwałego, objawowego leczenia:

- bólu o nasileniu małym do umiarkowanego,
- gorączki.

### Działanie

- Przeciwbólowe,
- Przeciwgorączkowe,
- Przeciwzapalne.

### Dawkowanie

Zazwyczaj stosowana dawka w przypadku bólu lub gorączki, to:

- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 5 kg (3 do 5 miesięcy): 1,25 ml 3 razy na dobę,
- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 7 do 9 kg (6 do 11 miesięcy) 1,25 ml 3 do 4 razy na dobę,
- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 10 do 15 kg (1 do 3 lat) 2,5 ml 3 razy na dobę,
- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 16 do 19 kg (4 do 5 lat) 3,75 ml 3 razy na dobę,
- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 20 do 29 kg (6 do 9 lat) 5 ml 3 razy na dobę,
- Masa ciała dziecka (wiek) powyżej 30 do 40 kg (10 do 12 lat) 7,5 ml (dwukrotne użycie strzykawki: 5 ml + 2,5 ml) 3 razy na dobę Dawki należy podawać co około 6 do 8 godzin.

Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli objawy nasilają się lub utrzymują.

- W ciągu 24 godzin u niemowląt w wieku 3 - 5 miesięcy
- W ciągu 3 dni u dzieci w wieku 6 miesięcy do 12 lat.

#### Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każdy 1 ml zawiesiny doustnej zawiera 40 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to: kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian, sodu chlorek, sacharynę sodową, polisorbat 80, bromek domifenu, malitol ciekły, glicerol, gumę ksantan, aromat pomarańczowy (skrobia modyfikowana, guma arabska, maltodekstryna, naturalne i identyczne z naturalnym substancje aromatyczne) i wodę oczyszczoną.

#### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub inne podobne leki przeciwbólowe (z grupy NLPZ) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Jeśli kiedykolwiek wystąpiła duszność, astma, katar lub pokrzywka po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (z grupy NLPZ). Jeśli kiedykolwiek wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego związana z wcześniejszym stosowaniem leków z grupy NLPZ. Jeśli obecnie występuje lub występowało owrzodzenie żołądka i (lub) dwunastnicy (choroba wrzodowa) lub krwawienie (dwa lub więcej potwierdzone przypadki owrzodzenia lub krwawienia). Jeśli występuje ciężka niewydolność wątroby, nerek lub serca. Jeśli występuje krwawienie w mózgu (krwawienie z naczyń mózgowych) lub inne czynne krwawienie. Jeśli występują zaburzenia krzepnięcia krwi, ponieważ ibuprofen może wydłużyć czas krwawienia. Jeśli u pacjenta występują zaburzenia wytwarzania krwi o nieustalonym pochodzeniu.

#### Przechowywanie

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- W sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
- Po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.