

Nurofen Express Caps 200mg, 10 kapsułek miękkih



Cena: 9,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg
Opakowanie	10 kapsułek
Postać	kapsułki miękkie
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Opis

Nurofen Express Caps 200 mg, lek w postaci kapsułek miękkih, przeznaczony jest do stosowania doraźnego. Zawiera 200 mg ibuprofenu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Kapsułka łatwo rozpada się w organizmie i substancja czynna szybko się wchłania i dociera do miejsca bólu. Lek do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci o masie ciała od 20 kg (w wieku około 6 lat).

Wskazania

Nurofen Express Caps stosuje się w krótkotrwałym leczeniu objawowym:

- łagodnego lub umiarkowanego bólu, takiego jak ból głowy, ból zęba, bolesne miesiączkowanie,
- bólu i gorączki związanych z przeziębieniem.

Dawkowanie

- Dzieci 20 kg – 29 kg: 1 kapsułka, w razie potrzeby przyjąć kolejną kapsułek po upływie co najmniej 8 godzin. W ciągu 24 godzin nie przyjmować więcej niż 3 kapsułki (do 600 mg ibuprofenu).
- Dzieci 30 kg – 39 kg: 1 kapsułka, w razie potrzeby, przyjąć kolejną kapsułek po upływie co najmniej 6 do 8 godzin. W ciągu 24 godzin nie przyjmować więcej niż 4 kapsułki (do 800 mg ibuprofenu).
- Dorośli i młodzież o masie ciała około 40 kg: 1 lub 2 kapsułki (200 mg lub 400 mg ibuprofenu), w razie potrzeby, dodatkowo 1 lub 2 kapsułki (200 mg do 400 mg ibuprofenu). Po zastosowaniu dawki 200 mg, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 4 godzin, po zastosowaniu dawki 400 mg, następną dawkę należy przyjąć nie wcześniej niż po upływie 6 godzin. W ciągu 24 godzin nie przyjmować więcej niż 6 kapsułek (do 1200 mg ibuprofenu).

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen, każda kapsułka zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki: Makrogol 600, Potasu wodorotlenek (min. 85 % sumy zasad, w przeliczeniu na KOH), Woda oczyszczona.

Skład kapsułki: Sorbitol ciekły, częściowo odwodniony; Żelatyna; Czerwień koszelinowa (E 124).

Tusz: 9; Opacode WB white NS-78-18011 (o składzie tytanu dwutlenek (E 171), glikol propylenowy, hypromeloza 3 cP).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na ibuprofen, czerwień koszenilową (E 124) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
- Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowały duszność, astma, nieżyt nosa, obrzęk twarzy i (lub) rąk lub pokrzywka po przyjęciu ibuprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych podobnych leków przeciwbólowych (NLPZ).
- Jeśli u pacjenta występuje owrzodzenie żołądka lub krwawienie z żołądka.
- Jeśli u pacjenta występowało w przeszłości krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką chorobę wątroby, nerek, chorobę wieńcową lub niewydolność serca.
- Jeśli u pacjenta stwierdzono krwawienie z naczyń mózgowych lub inne czynne krwawienie.
- U pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi.
- Jeśli u pacjenta występuje ciężkie odwodnienie (spowodowane wymiotami, biegunką lub niewystarczającym spożyciem płynów).
- W okresie ostatnich trzech miesięcy ciąży.

Działania niepożądane

Jak każdy lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.