

Nurofen Mięśnie i Stawy 50 mg/ g, żel, 100 g

Cena: 29,95 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Cena jednostkowa | 100 g |
| Dawka | 50 mg/g |
| Opakowanie | 100 g |
| Postać | żel |
| Producent | RECKITT BENCKISER POLAND S.A. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Ibuprofenum |
| Wiek | od 12 roku życia |

Opis produktu

Opis

Nurofen Mięśnie i Stawy, to żel do stosowania miejscowego na skórę. Zastosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i zmniejsza obrzęk. 1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu, który należy do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

Wskazania

Do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak: lekkie postaci zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

Działanie

Zastosowany miejscowo na skórę łagodzi ból i zmniejsza obrzęk.

Dawkowanie

- Do miejscowego stosowania na skórze. Wyłącznie do stosowania krótkotrwałego.
- Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: wycisnąć z tuby 4 do 10 cm żelu na miejsce objęte dolegliwościami (ilość ta odpowiada dawce 50 do 125 mg ibuprofenu). Żel delikatnie wsmarować w skórę do momentu jego wchłonięcia, a następnie umyć ręce.
- Nie należy stosować leku na to samo miejsce wcześniej niż po upływie 4 godzin.
- Nie należy stosować leku częściej niż 4 razy na dobę.
- Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania leku objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zasięgnąć porady lekarza.

Skład

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

1 gram leku Nurofen Mięśnie i Stawy w postaci żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki leku to: hydroksyetyloceluloza, sodu wodorotlenek, alkohol benzylowy, alkohol izopropylowy, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli u pacjenta wystąpiły uprzednio reakcje nadwrażliwości, np. astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, obrzęk naczynioruchowy lub pokrzywka w odpowiedzi na ibuprofen, kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
- III trymestr ciąży.
- Uszkodzona skóra.

Działania niepożądane

- Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób): toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy.
- Częstość nieznaną: nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych: nadwrażliwość; ból brzucha, niestrawność; upośledzenie czynności nerek; reakcje w miejscu podania, zmiany skórne (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne. Astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej i skurcz oskrzeli. Różnorodne wysypki, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30oC.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli objawy choroby ulegają pogorszeniu lub utrzymują się po 2 tygodniach leczenia, należy zasięgnąć opinii lekarza. Nie wolno stosować dłużej niż 14 dni bez opinii lekarza.
- U pacjentów stosujących ibuprofen, u których występowała wcześniej astma oskrzelowa lub choroba alergiczna, może wystąpić skurcz oskrzeli.
- Pacjentom z astmą, którzy wcześniej nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, należy zalecić skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Sugeruje się związek pomiędzy stosowaniem NLPZ podawanych miejscowo a niewydolnością nerek. Pacjentom z chorobami nerek w wywiadzie należy zalecić zasięgnięcie opinii lekarza przed zastosowaniem leku.
- Ibuprofen stosowany miejscowo może potencjalnie powodować działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego. Mimo, że ryzyko wystąpienia, takich działań niepożądanych jest znacznie mniejsze niż po stosowaniu ibuprofenu doustnie, należy zalecić pacjentom z zaburzeniami, takimi jak: choroba wrzodowa czynna lub w wywiadzie, stan zapalny jelit lub skaza krwotoczna, skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem leku.
- Choć wchłanianie ustrojowe miejscowo stosowanego ibuprofenu jest znacząco niższe, niż w przypadku postaci doustnych, w rzadkich przypadkach mogą wystąpić powikłania. Z tego względu, pacjenci z chorobą wrzodową czynną lub w wywiadzie, stanem zapalnym jelit lub skazą krwotoczną powinni przed zastosowaniem tego produktu zasięgnąć rady lekarza.
- Lek wyłącznie do użytku zewnętrznego. Lek należy delikatnie wmasować. Leku nie należy stosować na uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym skórę. Należy unikać kontaktu z oczami i z błoną śluzową jamy ustnej. W razie wystąpienia wysypki, lek należy odstawić.
- Aby obniżyć ryzyko nadwrażliwości na światło, podczas leczenia ibuprofenem należy chronić leczony obszar przed oddziaływaniem silnych źródeł światła naturalnego lub sztucznego.
- Lek nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym.
- Po zastosowaniu leku należy umyć ręce.
- Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12 lat bez zaleceń lekarza.
- Należy unikać stosowania leku w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. W trzecim trymestrze ciąży, stosowanie leku jest przeciwwskazane.
- Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią w bardzo małych stężeniach i wydaje się niemożliwe, aby niekorzystnie wpływał na niemowlę karmione piersią. Ze względu na fakt, iż dostępność biologiczna ibuprofenu podawanego miejscowo wynosi około 5% dostępności biologicznej dawki doustnej, uważa się, że ilość leku przyjmowana przez niemowlę karmione piersią jest znikoma.
- Niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą wchodzić w interakcje z lekami przeciwnadciśnieniowymi i mogą prawdopodobnie nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych. Jednakże, w przypadku poprawnego stosowania, przenikanie ibuprofenu do organizmu jest małe, więc występowanie opisywanych interakcji związanych z ibuprofenem podawanym doustnie jest mało prawdopodobne.

- Jednoczesne stosowanie kwasu acetylosalicylowego i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może skutkować podwyższeniem częstości występowania działań niepożądanych.
- W przypadku pojawienia się wysypki należy przerwać stosowanie leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.