

Nurofen Mięśnie i stawy, plaster leczniczy, 2 sztuki

Cena: 26,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	0,2 g
Opakowanie	2 sztuki
Postać	plaster leczniczy
Producent	RECKITT BENCKISER POLAND S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Ibuprofenum

Opis produktu

Wskazania

Do krótkotrwałego objawowego leczenia miejscowego ostrego bólu spowodowanego:

- naciągnięciem mięśni,
- zwicnięciem.

Działanie

Przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Dawkowanie

Do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 16 lat: Maksymalna dawka w okresie 24 godzin to jeden plaster leczniczy. Maksymalny czas stosowania to 5 dni. Do stosowania wyłącznie na skórę, nie stosować na zranioną lub uszkodzoną skórę.

Przed nałożeniem plastra umyć i osuszyć miejsce aplikacji plastra. Plastra należy używać w całości nie wolno go przecinać. Plastra nie należy stosować razem z opatrunkiem okluzyjnym. Plaster jest elastyczny i łatwo dopasowuje się do ruchomych powierzchni ciała, dlatego w razie potrzeby można go nakładać na staw lub w jego pobliżu. Plaster umożliwia wykonywanie prawidłowego ruchu.

Plaster można nakładać o dowolnej porze w ciągu dnia lub nocy, ale należy go usunąć i nakleić nowy plaster następnego dnia o tej samej porze.

1. Aby wyjąć plaster leczniczy, saszetkę należy rozerwać/przeciąć wzdłuż kropkowanej linii.
2. Usunąć plastikową folię oznaczoną (A) i umieścić plaster na nienaruszonej skórze.
3. Usunąć plastikową folię oznaczoną (B) i lekko rozciągając, wygładzić tę część plastra na skórze.
4. Usunąć plastikową folię oznaczoną (C).
5. Lekko rozciągając, wygładzić pozostałą część plastra na skórze.

Skład

Każdy plaster leczniczy zawiera 200 mg Ibuprofenu

Substancje pomocnicze: warstwa przylegająca: makrogol 400, makrogol 20000, lewomentol, kopolimer blokowy Styren-Izopren-Styren 22, poliizobutylen (PIB) 55k, poliizobutylen (PIB) 1100k, ester uwodornionej kalafonii z glicerolem, parafina ciekła, warstwa powlekająca: etylenu politereftalan, tkany, warstwa ochronna: etylenu politereftalan silikonowany

Przechowywanie

- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
- Po pierwszym otwarciu saszetki 6 miesięcy.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.