

Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 1 L



Cena: 79,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	(0,10 g + 2 g)/ 100 g
Opakowanie	1 l
Postać	płyn
Producent	SCHULKE & MAYR GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Octenidini dihydrochloridum, Phenoxyethanolum

Opis produktu

Wskazania

Profilaktyka i leczenie ran oraz zakażeń błon śluzowych i skóry dorosłych i dzieci w każdym wieku.

Działanie

Bakteriobójcze.
Wirusobójcze.
Grzybobójcze.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na dichlorowodorek oktenidyny, fenoksyetanol lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Nie należy stosować produktu leczniczego Octenisept® do płukania jamy brzusznej.

Dichlorowodorek oktenidyny jest bardziej toksyczny przy stosowaniu dożylnym niż doustnym, dlatego należy unikać przedostawania się leku w większych ilościach do krwiobiegu np. na skutek pomyłkowej iniekcji. Z uwagi na to, że dichlorowodorek oktenidyny w leku Octenisept® występuje tylko w ilości 0,1% zagrożenie tą substancją jest ekstremalnie mało prawdopodobne.

Stosowanie

Spryskać, przetrzeć jałowym gazikiem lub za pomocą przymocznika zapewniając całkowite nawilżenie nierozcierczonym płynem minimum raz na dobę leczony obszar.

Skład

100 g płynu zawiera substancje czynne: oktenidyny dichlorowodorek 0,10 g, fenoksyetanol 2,00 g, substancje pomocnicze: kokamidopropylobetaina - roztwór 30% lub 38% (octan dimetyloamoniowy kwasu amidopropylokokosowego, sodu chlorek, woda), sodu D-glukonian, glicerol 85%, sodu wodorotlenek, woda oczyszczona.

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.