

Octenisept Oral Mono, roztwór do jamy ustnej

Cena: 33,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	250 ml (butelka)
Postać	roztwór do stosowania w jamie ustnej
Producent	SCHULKE & MAYR GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Octenidinum

Opis produktu

Opis

Octenisept Oral Mono 1 mg/ml to lek w postaci roztworu przeznaczony do płukania jamy ustnej o działaniu antybakteryjnym.

Wskazania

Do czasowego zmniejszenia liczby bakterii w jamie ustnej oraz czasowego zahamowania tworzenia się płytki nazębnej, w przypadku niedostatecznej higieny jamy ustnej.

Dawkowanie

- Płukać jamę ustną 10 ml roztworu przez 30 sekund, dwa razy na dobę.
- Po użyciu roztwór należy wypłuć.

Skład

1 ml roztworu zawiera 1 mg octenidini dihydrochloridum (oktenidyny dwuchlorowodorek).

Substancje pomocnicze: Glicerol 85%, sodu glukonian, kwas cytrynowy, disodu fosforan dwuwodny (do ustalenia pH), makroglicerolu hydroksystearynian, sukraloza, woda oczyszczona, aromat miętowy (zawiera glikol propylenowy (49%), mentol (45%), menton (6%))

Przeciwwskazania

- Octenisept oral mono należy stosować wyłącznie do płukania jamy ustnej. Nie należy go połykać.
- Dlatego powinien być stosowany przez pacjentów, którzy mogą samodzielnie płukać jamę ustną.
- Unikać kontaktu produktu leczniczego z oczami. W razie kontaktu roztworu z oczami należy je szybko i dokładnie wypłukać wodą.

Działania niepożądane

- Nie wolno podawać tego produktu leczniczego w głąb tkanek za pomocą strzykawki lub kaniuli aby zapobiec potencjalnemu rozwojowi obrzęków lub martwicy tkanek. W szczególności nie należy go stosować do płukania kieszonek przyzębnych, płukania kanałów korzeniowych podczas zabiegów endodontycznych ani do płukania ropni jamy ustnej.
- Oktenidyny dwuchlorowodorek może wchodzić w interakcje ze anionowymi środkami obecnymi

w produktach do mycia zębów. Dlatego należy je stosować przed użyciem produktu leczniczego octenisept oral mono (jamę ustną należy wypłukać wodą przed użyciem produktu leczniczego) lub o innej porze dnia.

- Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego octenisept oral mono i produktów

zawierających powidon jodowany do stosowania w jamie ustnej, ponieważ może to powodować fioletowe lub brązowe zabarwienie jamy ustnej oraz miejscowe podrażnienie.

Przechowywanie

Po pierwszym otwarciu opakowania należy zużyć:

- Butelka 60 ml: 2 tygodnie
- Butelka 250 ml: 8 tygodni

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Oktenidyny dwuchlorowodorek może wchodzić w interakcje ze anionowymi środkami obecnymi

w produktach do mycia zębów. Dlatego należy je stosować przed użyciem produktu leczniczego octenisept oral mono (jamę ustną należy wypłukać wodą przed użyciem produktu leczniczego) lub o innej porze dnia.

- Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu leczniczego octenisept oral mono i produktów

zawierających powidon jodowany do stosowania w jamie ustnej, ponieważ może to powodować fioletowe lub brązowe zabarwienie jamy ustnej oraz miejscowe podrażnienie.

Dodatkowe informacje

Nie należy stosować dłużej niż 5 dni