

Oftahist 1 mg/ml, krople do oczu, roztwór, 5 ml



Cena: 30,71 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	1 butelka x 5ml
Postać	krople do oczu, roztwór
Producent	ADAMED SP.Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Olopatadinum

Opis produktu

Wskazania

Leczenia podmiotowych i przedmiotowych objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Działanie

Zmniejszenie nasilenia reakcji uczuleniowych.

Dawkowanie

1 kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę – rano i wieczorem.

Skład

- Substancją czynną leku jest olopatadyna 1 mg/ml (w postaci chlorowodoru)

– Pozostałe składniki leku to benzalkoniowy chlorek, sodu chlorek, disodu wodorofosforan bezwodny, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), kwas solny (do ustalenia pH), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Częste działania niepożądane (do 10 na 100 pacjentów):

- Działania dotyczące oka: ból lub obrzęk oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.
- Działania dotyczące całego organizmu: bóle głowy, zmęczenie, suchość nosa, nieprzyjemny smak w ustach.

Niezbyt częste działania niepożądane (do 1 na 100 pacjentów):

- Działania dotyczące oka: niewyraźne, ograniczone lub nieprawidłowe widzenie, zaburzenia rogówki, zapalenie lub zakażenie spojówek, wydzielina z oka, alergia oka, nadwrażliwość na światło, zwiększone wytwarzanie łez, świąd oka, zaczerwienienie oka, nieprawidłowości w obrębie powiek, świąd, zaczerwienienie, obrzęk lub grudki na powiekach.
- Działania dotyczące całego organizmu: nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zawroty głowy, nieżyt nosa, suchość skóry, zapalenie skóry, zaczerwienienie i świąd.

Dodatkowo opisywane działania niepożądane obejmują:

- Działania dotyczące oka: zmiana wielkości źrenicy.
- Działania dotyczące całego organizmu: skrócenie oddechu, nasilenie objawów alergicznych, obrzęk twarzy, senność, ogólne osłabienie, nudności, wymioty, zakażenie zatok.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
- Po zakropleniu leku przez pewien czas może występować niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych lub obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.
- Oftahist zawiera benzalkoniowy chlorek. Środek może powodować alergiczne podrażnienie skóry. Nie stosować przy założonych miękkich soczewkach kontaktowych.

Po zakropleniu leku należy odczekać 10-15 minut i dopiero potem założyć soczewki. Może powodować odbarwienie miękkich soczewek kontaktowych.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.