

# Oleofarm Jonolit, elektrolity, smak truskawkowy, 10 saszetek



Cena: 10,39 zł

## Opis słownikowy

Opakowanie	10 saszetek
Postać	proszek
Producent	OLEOFARM SP. Z O.O.
Rejestracja	Dietetyczny środek spożywczy
Wiek	od 3 roku życia

## Opis produktu

### Opis

Jonolit, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego w postaci proszku do przygotowania doustnego płynu nawadniającego o zmniejszonej osmolarności i zawartości sodu, którego skład zgodny jest z zaleceniami ESPGHAN.

### Zastosowanie

Do postępowania dietetycznego w stanach odwodnienia organizmu, w trakcie biegunki i/lub wymiotów dla dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.

### Zalecane spożycie

- Masa ciała 11-15,9 kg (wiek: 3-4 lata): faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania): zawartość 4-6 saszetek rozpuścić w 800-1200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszетка na 200 ml wody); podawać małymi porcjami. Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania): zawartość 1 saszетки rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml wody; podawać 100-200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu nawadniającego.
- Masa ciała 16-29,9 kg (wiek: 5-14 lat): faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania): zawartość 6-11 saszetek rozpuścić w 1200-2200 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszетка na 200 ml wody); podawać małymi porcjami. Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania): zawartość 1 saszетки rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml wody; podawać 100-200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu nawadniającego.
- Masa ciała >30 kg (wiek: > 15 lat): faza nawadniania (pierwsze 4 godziny nawadniania): zawartość 11-20 saszetek rozpuścić w 2200-4000 ml (zgodnie z instrukcją 1 saszетка na 200 ml wody); podawać małymi porcjami. Faza nawadniania podtrzymującego (dalsze etapy nawadniania): zawartość 1 saszетки rozpuścić zgodnie z instrukcją w 200 ml wody; podawać 100-200 ml płynu po każdym epizodzie wymiotów lub oddanym stolcu biegunkowym; powyżej 15-go roku życia można przyjmować większe ilości płynu nawadniającego.

Saszetkę należy otworzyć, a następnie jej zawartość rozpuścić w 200 ml ciepłej, przegotowanej wody. Przed podaniem ostudzić. Sporządzonego roztworu nie należy dosładzać. Płyn należy spożyć bezpośrednio po przygotowaniu. Roztwór nie nadaje się do spożycia po upływie 24 godzin po przygotowaniu.

**Skład**

Glukoza, cytrynian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, aromat truskawkowy z innymi aromatami naturalnymi, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, substancja słodząca: glikozydy stewiolowe. Nie zawiera owoców.

Wartość odżywcza	100 g produktu w saszetkach	200 ml produktu sporządzonego zgodnie z instrukcją przygotowania
wartość energetyczna (energia)	1343 kJ / 316 kcal	68 kJ / 16 kcal
tłuszcz, w tym:	0,0 g	0,0 g
kwasy tłuszczowe nasycone	0,0 g	0,0 g
węglowodany, w tym:	79 g	4,0 g
cukry	74 g	3,8 g
białko	0,0 g	0,0 g
sól, z czego	12 g	0,61 g
sód	4690 mg	276 mg

- 200 ml płynu przygotowanego zgodnie z instrukcją zawiera: 3,78 g glukozy, 379 mg cytrynianu, 355 mg chlorków, 276 mg sodu, 157 mg potasu.
- Osmolarność roztworu: 245 mOsm/l.

**Przechowywanie**

- W temperaturze pokojowej, w suchym i ciemnym miejscu.
- W sposób niedostępny dla małych dzieci.
- Nie zamrażać.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Przeciwwskazaniem do stosowania jest: występowanie krwi w stolcu, słaba wydolność nerek, wstrząs hemodynamiczny, niedrożność jelit.
- Produkt przyjmuje się według wskazań lekarza i pod jego nadzorem. Nie stanowi wyłącznego źródła pożywienia. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci powyżej 3-go roku życia i dorosłych.

**Dodatkowe informacje**

- Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.
- Utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia wymaga zrównoważonego odżywiania i prowadzenia zdrowego trybu życia.