

Olimp DiosMax 1 g, 30 tabletek



Cena: 31,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 g
Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diosminum

Opis produktu

Opis

DiosMax jest lekiem zawierającym zmikronizowaną diosminę,

Wskazania

- Leczenie objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak: obrzęki, uczucie zmęczenia, ból i ciężkość nóg, pieczenie, nocne skurcze oraz poszerzanie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. „pajęczki”);
- Objawowe leczenie żylaków kończyn dolnych;
- Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów).

Działanie

Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy oraz poprawia powrót krwi z układu żylnego oraz zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych. Diosmina zmniejsza też przepuszczalność małych naczyń krwionośnych – ogranicza stany zapalne, zwłaszcza w zapaleniach okołożyłnych. Poprzez przywrócenie naczyniom włosowatym prawidłowej przepuszczalności zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

- Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych: zalecana dawka to 1 tabletkę raz na dobę, podczas posiłku. W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni.

- Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu: zalecana dawka to 1 tabletkę 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

Skład

- Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletką zawiera 1000 mg diosminy w postaci zmikronizowanej.
- Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka Opadry II Clear (alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk)

Przeciwwskazania

Uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.