

Olimp Panaprex 500 mg, 12 tabletek



Cena: 4,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	12 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	OLIMP LABORATORIES
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Lek jest wskazany w leczeniu gorączki (w przeziębieniu, grypie) oraz w objawowym leczeniu bólu różnego pochodzenia o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

Wskazania

Panaprex wykazuje działanie przeciwbólowe w leczeniu bólów takich jak:

- bóle głowy,
- migrena,
- bóle kości i stawów,
- bóle mięśni,
- bóle pleców,
- bóle zębów,
- bóle pooperacyjne,
- bolesne miesiączkowanie,
- ból gardła.

Dawkowanie

- Dorośli, osoby w podeszłym wieku i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała powyżej 50 kg): doustnie, 1 do 2 tabletek. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 4 g (8 tabletek).
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 - 50 kg): doustnie, 1 tabletkę jednorazowo. W razie konieczności dawkę można powtarzać nie częściej niż co 4 godziny, do 6 razy na dobę. Maksymalna dawka dobową paracetamolu wynosi 3 g (6 tabletek).

Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletką zawiera 500 mg paracetamolu.
Pozostałe składniki: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, powidon K90, woda oczyszczona, krzemionka koloidalna bezwodna, kroscarmeloza sodowa, sodu stearylofumarany), otoczka Opadry 200 White (alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, makrogol 3350, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1), sodu węglan).

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Panaprex:

- jeśli pacjent ma uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność nerek,
- jeżeli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby,
- u dzieci w wieku poniżej 12 lat,
- jeżeli u pacjenta występuje choroba alkoholowa.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia:

- Reakcji alergicznej (uczulenia), której objawy mogą obejmować: wysypkę skórą, swędzenie, pokrzywkę lub złuszczenie się skóry, owrzodzenia jamy ustnej, czasem połączone z utrudnionym oddychaniem lub opuchlizną warg, języka, gardła lub twarzy.
- Wstrząsu anafilaktycznego (ciężka reakcja alergiczna objawiająca się m.in. zawrotami głowy, zaburzeniami świadomości, przyspieszeniem czynności serca, spadkiem ciśnienia krwi).
- Problemów z oddychaniem, w przypadku gdy podobne problemy występowały w przeszłości podczas stosowania kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
- Zaburzeń czynności wątroby.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli po upływie 3 dni leczenia bólu lub gorączki nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku.