

# Orofar (2 mg + 1,5 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml



Cena: 24,29 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Dawka	(2mg+1,5mg)/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	aerozol do stosowania w jamie ustnej
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzoxonium chloride, Lidocainum hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

- Zakażenia gardła.
- Zakażenia jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).
- Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).
- Lek jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

### Działanie

- Antyseptyczne, miejscowo przeciwbólowe.
- Lek ten zwalcza bakterie, wirusy i grzyby wywołujące zakażenia gardła i jamy ustnej.
- Lek łagodzi ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

### Dawkowanie

- Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami.
- U dzieci lek należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu.
- Dorośli: zalecana dawka to 4 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami.

- Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

#### Sposób podawania:

- zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną,
- lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę dozownika,
- przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia, trzymając pojemnik z dala od twarzy należy naciskać pompkę do momentu rozpylenia jednej dawki leku w powietrze,
- trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła. Należy wstrzymać oddech w trakcie rozpylenia,
- po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być oczyszczona i wysuszona,
- po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją razem z preparatem w opakowaniu zewnętrznym,
- aby uniknąć rozprzestrzeniania się zakażenia końcówka dozownika powinna być stosowana tylko przez jedną osobę,
- nie należy stosować leku gdy końcówka dozownika jest uszkodzona.

#### Skład

- Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i lidokainy chlorowodorek. 1ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku.

Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego chlorku i 0,2098 mg lidokainy chlorowodorku.

- Pozostałe składniki leku to: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1 N, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

Uczulenie na: Benzoksoniowy chlorek lub inne czwartorzędowe sole amoniowe; Którykolwiek z pozostałych składników tego leku; Lidokainy chlorowodorek lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe.

#### Działania niepożądane

- Działania niepożądane są bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób): mogą być objawem reakcji alergicznej: Trudności w oddychaniu lub przełykaniu; Opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła; Silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami.
- Niektóre objawy niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): Podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C.
- Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Orofar Total Action gdy: Bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem, Objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni.
- Leku nie należy rozpylać w pobliżu oczu ani wdychać (należy wstrzymać oddech przy rozpylaniu).
- Podczas stosowania tego leku należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła.
- Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Nie należy stosować tego leku bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia lub picia: miejscowo znieczulające działanie lidokainy może spowodować wystąpienie przejściowego uczucia drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu. Należy powstrzymać się od jedzenia i picia do czasu, kiedy uczucie odrętwienia ustąpi.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek ten zawiera etanol: zawartość etanolu jest mniejsza niż 100 mg/dawkę (jedno rozpylenie zawiera 140 mikrolitrów  $\pm$  25%, zawierających 13,132 mg  $\pm$  25% etanolu a maksymalna jednorazowa dawka produktu to 4 rozpylenia).

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.