

# Orofar Junior 1 mg + 1 mg, smak pomarańczowy, 24 tabletki do ssania



Cena: 17,56 zł

## Opis słownikowy

Dawka	1mg+1mg
Opakowanie	24 tabletki do ssania
Postać	tabletki do ssania
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Benzoxonium chloride, Lidocainum hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

- Zakażenia gardła;
- Zakażenia jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty).
- Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).
- Lek do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

### Działanie

- Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe oraz przeciwbólowe. Zawiera substancję o działaniu antyseptycznym - benzoksoniowy chlorek oraz

składnik znieczulający (miejscowo działającą substancję przeciwbólową). Lek zwalcza bakterie, wirusy i grzyby wywołujące zakażenia gardła i jamy ustnej. Lek łągodzi

### Dawkowanie

- Dorośli: 1 tabletkę należy ssać powoli co dwie – trzy godziny. W przypadku nasilonego zakażenia dawkę można zwiększyć do jednej tabletki co jedną lub dwie godziny. Nie należy stosować więcej niż dziesięć tabletek w ciągu doby. W przypadku leczenia aft, należy pozwolić tabletkce rozpuszczać się powoli w pobliżu miejsca

zmienionego chorobowo.

- Dzieci w wieku powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż sześć tabletek w ciągu doby.

- Nie należy stosować tego leku bezpośrednio przed ani w trakcie jedzenia.
- Nie należy żuć ani połykać tabletek.
- Nie należy przekraczać zalecanych dawek.

#### Skład

- Substancjami czynnymi leku są chlorek benzoksoniowy i chlorowodorek lidokainy. Jedna tabletkta tego leku zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego + 1 mg chlorowodoru lidokainy.
- Pozostałe składniki to: sorbitol, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 6000, skrobia kukurydziana, sacharyna sodowa, sodu chlorek, kwas cytrynowy jednowodny, aromat pomarańczowy, magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

Uczulenie na: benzoksoniowy chlorek lub inne czwartorzędowe sole amoniowe, którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lidokainy chlorowodorek lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe.

#### Działania niepożądane

- Objawy niepożądane są bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób): trudności w oddychaniu lub przełykaniu; Opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła; Silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami.
- Niektóre objawy niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.

#### Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W temperaturze poniżej 30°C. Chronić od wilgoci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Orofar Junior gdy: bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem; objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni.
- Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat.
- Podczas stosowania tego leku należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła.
- Leku tego nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
- Nie należy stosować tego leku bezpośrednio przed lub w trakcie jedzenia lub picia: miejscowo znieczulające działanie lidokainy może spowodować wystąpienie przejściowego uczucia drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu. Należy powstrzymać się od jedzenia i picia do czasu kiedy uczucie drętwienia nie ustąpi.
- Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna przed zastosowaniem tego leku poradzić się lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.
- Lek ten zawiera sorbitol (E420). Jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.