

# Orofar Max 2 mg + 1 mg o smaku miętowym, 20 pastylek twardych



Cena: 18,85 zł

## Opis słownikowy

Dawka	2mg+1mg
Opakowanie	20 pastylek twardych
Postać	pastylki twarde
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetylpirydynii chloridum, Lidocainum hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

W miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.

### Działanie

- Chlorek cetylpirydyniowy - substancja o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działająca bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.
- Chlorowoderek lidokainy - substancja o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

### Dawkowanie

- Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.
- Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

### Skład

- Substancjami czynnymi leku są cetylpirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowoderek. Jedna pastylka Orofar MAX zawiera: 2 mg cetylpirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru.

- Inne składniki leku to olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

#### Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

#### Działania niepożądane

- Rzadko może wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty.
- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna. Należy wówczas przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeżeli stan zapalny gardła i gorączka utrzymują się przez kilka dni, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Jeżeli ból gardła jest połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 5 dni stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.
- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Nie należy stosować tego leku podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.
- Ten lek może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie na zlecenie lekarza.
- Leku tego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.
- Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeżeli jest stosowany w zalecanych dawkach.
- Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.