

Orofar Max 2 mg + 1 mg o smaku miętowym, 30 pastylek twardych



Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	2mg+1mg
Opakowanie	30 pastylek twardych
Postać	pastylki twarde
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cetylpyridinii chloridum, Lidocainum hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

W miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.

Działanie

- Chlorek cetylopirydyniowy - substancja o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działająca bakteriobójczo, przeciugrzybiczo i przeciwwirusowo.
- Chlorowodorek lidokainy - substancja o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.

Dawkowanie

- Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.
- Leku nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
- Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

Skład

- Substancjami czynnymi leku są cetylopirydyniowy chlorek i lidokainy chlorowodorek. Jedna pastylka Orofar MAX zawiera: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoru.

- Inne składniki leku to olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Działania niepożądane

- Rzadko może wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i wymioty.
- W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna. Należy wówczas przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeżeli stan zapalny gardła i gorączka utrzymują się przez kilka dni, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Jeżeli ból gardła jest połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami, przed zastosowaniem tego leku należy zwrócić się po poradę do lekarza.
- Jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 5 dni stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.
- Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.
- Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.
- Nie należy stosować tego leku podczas jedzenia ani tuż przed jedzeniem.
- Ten lek może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie na zlecenie lekarza.
- Leku tego nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.
- Lek ten nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, jeżeli jest stosowany w zalecanych dawkach.
- Lek zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.