

Orogermina, spray do gardła, 1 zestaw



Cena: 37,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	1 zestaw
Producent	VITAMED
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Orogermina, to wyrób medyczny o działaniu mechanicznym, przeznaczony do przywracania naturalnej bariery biologicznej tworzonej przez saprofity stanowiące prawidłową florę bakteryjną.

Zastosowanie

- Zapobieganie infekcjom gardła i migdałków,
- Po miejscowej i/lub doustnej antybiotykoterapii, w celu ułatwienia odtworzenia prawidłowej flory bakteryjnej gardła,
- We wszystkich przypadkach, gdy konieczne jest przywrócenie prawidłowej flory bakteryjnej gardła.

Sposób użycia

- Opakowanie zawiera 2 butelki, 2 saszetki i 2 pompki rozpylające. Zaleca się każdorazowo przygotowanie jednej butelki z preparatem bezpośrednio przed zastosowaniem.
- Dorośli i dzieci: 2 rozpylenia 1 raz dziennie przez 30 kolejnych dni, używając obie butelki. Drugą butelkę należy przygotować w odstępie 15 dni od przygotowania pierwszej. Zaleca się powtarzanie terapii przez co najmniej 3 miesiące lub zgodnie z zaleceniami lekarza.

Jak stosować:

- Wsypać zawartość saszetki do butelki, szczególnie uważając aby nie rozsypać zawartości.
- Zamknąć butelkę i energicznie wstrząsnąć.
- Otworzyć butelkę, zerwać zabezpieczenie dolnej części pompki i umieścić ją w butelce.
- Energicznie potrząsnąć, zdjąć osłonę z pompki rozpylającej.
- Kilukrotnie nacisnąć pompkę aby ją uruchomić.
- Wstrzymać oddech i zaaplikować roztwór do gardła.
- Po zastosowaniu odstawić produkt do lodówki.
- Przed kolejnym zastosowaniem należy wyjąć spray z lodówki i pozostawić w temperaturze pokojowej na około 15 minut. Przed aplikacją należy dokładnie wstrząsnąć butelką.
- Zużyć w ciągu 15 dni od jego rozpuszczenia oraz przechowywać w lodówce (4oC).

Skład

- Każda saszetka zawiera: liofilizowany *Streptococcus salivarius* 24SMBc i *Streptococcus oralis* 89a (min. 125×10^9 CFU*/g): 1g, substancję przeciwzbrylającą.
- Każda butelka zawiera: kopolimer PEG/PPG, fruktozę, dimetykon PEG-14, cytrynian potasu, kwas cytrynowy, aromat, wodę oczyszczoną.

Przechowywanie

- Preparat w postaci nierozpuszczonej przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 15oC. Preparat w postaci rozpuszczonej przechowywać w lodówce (4oC).
- Z dala od źródła ciepła.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
- Nie stosować u osób z wrodzonym lub nabytym niedoborem odporności, z chorobami nowotworowymi, otrzymujących chemioterapię lub z założonym cewnikiem do żyły centralnej.
- W przebiegu lub po przebyciu zapalenia wsierdza i/lub w przypadku chorób serca predysponujących do rozwoju zapalenia wsierdza nie należy stosować tego wyrobu medycznego.
- Nie połykać.
- Przygotowany do spożycia preparat można stosować do 15 dni od przygotowania każdej butelki.
- Unikać kontaktu z oczami.