

OST 20 mg/ 2 ml, roztwór do iniekcji, 2 ml x 1 ampułkostrzykawka



Cena: 109,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	20 mg/ 2 ml
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka
Postać	roztwór do iniekcji
Producent	TRB CHEMEDICA AG
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Natrii hyaluronas

Opis produktu

Opis

OST 20 mg/ 2 ml, roztwór do iniekcji, przeznaczony do użycia w przypadku bólu oraz ograniczonej ruchliwości stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych w przebiegu zmian degeneracyjnych i pourazowych. Kwas hialuronowy zapewnia właściwości viskoelastyczne.

Zastosowanie

Ból oraz ograniczona ruchliwość stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych w przebiegu zmian degeneracyjnych i pourazowych.

Sposób użycia

- 3-5 iniekcji do stawu w odstępach jednotygodniowych. Jednocześnie może być leczonych kilka stawów. W zależności od stopnia zaawansowania choroby korzystny efekt cyklu pięciu iniekcji dostawowych utrzymuje się co najmniej 6 miesięcy. W razie potrzeby można kurację powtórzyć. W przypadku wysięku w stawie wskazane jest jego zmniejszenie poprzez aspirację, odpoczynek, okład z lodu i/lub dostawową iniekcję kortykosterydu. Leczenie może być rozpoczęte po 2-3 dniach.
- Zawartość i zewnętrzna powierzchnia ampułkostrzykawki jest jałowa tak długo, jak sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone.
- Wyjąć ampułkostrzykawkę z jałowego opakowania, odkręcić osłonkę z końcówki luer lock, zamocować odpowiednią igłę (np. 19 do 21G) i zatrasnąć, lekko obracając.

Jeśli w strzykawce znajduje się pęcherzyk powietrza należy go usunąć przed iniekcją.

Skład

1 ml izotonicznego roztworu zawiera 10 mg soli sodowej kwasu hialuronowego oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu, wodę do iniekcji.

Przechowywanie

- W temperaturze 2 - 25oC.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używać po upływie terminu ważności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
- OST powinien być wstrzyknięty dokładnie do przestrzeni stawowej.
- Wyrób medyczny wyłącznie do użytku lekarza.
- Unikać iniekcji do naczyń krwionośnych i okolicznych tkanek.
- Do jednorazowego użycia.
- Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, a także w chorobach zapalnych stawów jak reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Bechterewa.
- Nie używać jeżeli ampułkostrzykawką lub sterylne opakowanie są uszkodzone.