

OST Plus 40 mg/ 2 ml, roztwór do iniekcji, 2 ml x 1 ampułkostrzykawka



Cena: 299,00 zł

Opis słownikowy

Dawka	40 mg/ 2 ml
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka
Producent	TRB CHEMEDICA AG
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy
Substancja czynna	Natrii hyaluronas

Opis produktu

Opis

Wyrób medyczny OST Plus roztwór wiskoelastyczny do iniekcji do przestrzeni stawowej. Sterylizowany parą wodną. Preparat jest przezroczystym roztworem naturalnego, wysokooczyszczonego hialuronianu sodu, otrzymanego metodą fermentacji i z tego względu wolnego od białek zwierzęcych. Preparat jest stabilizowany mannitolem, pełniącym dodatkowo rolę zmiatacza wolnych rodników.

Zastosowanie

Ból i ograniczona ruchomość stawu kolanowego i innych stawów maziówkowych w przebiegu zmian degeneracyjnych i pourazowych.

Sposób użycia

- 1-3 iniekcji do stawu w odstępach jedynogodniowych. Możliwe jest jednoczesne leczenie kilku stawów. W razie potrzeby można powtarzać cykle leczenia.
- W razie wystąpienia wysięku śródstawowego zaleca się jego zmniejszenie poprzez aspirację, unieruchomienie stawu, przyłożenie okładu chłodzącego i (lub) dostawowe podanie kortykosteroidów. Po 2-3 dniach można rozpocząć leczenie preparatem OST Plus.
- Zawartość i zewnętrzna powierzchnia ampułkostrzykawki preparatu jest jałowa tak długo, dopóki sterylne opakowanie pozostaje nieuszkodzone.
- Wyjąć ampułkostrzykawkę z jałowego opakowania, odkręcić osłonkę z końcówki leura lock, zamocować odpowiednią igłę i zatrzasknąć, lekko obracając.
- Jeśli w strzykawce znajduje się pęcherzyk powietrza, należy go usunąć przed iniekcją.

Skład

1 ml izotonicznego roztworu (pH 7,3) zawiera 20,0 mg soli sodowej kwasu hialuronowego otrzymanego metodą fermentacji oraz chlorek sodu, wodorofosforan sodu, dwuwodorofosforan sodu, mannitol i wodę do iniekcji.

Przechowywanie

W temperaturze 2-25oC.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.