

Otinum 0,2 g/ g, krople do uszu, 10 g



Cena: 31,49 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/g
Opakowanie	10 g
Postać	krople do uszu, roztwór
Producent	VALEANT SP. Z O.O. SP.J.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cholini salicylas
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem.
- Do zmiękczenia woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

Działanie

Lek miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Salicylan choliny stosowany miejscowo ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Dzięki temu zmniejsza ból oraz stan zapalny w przebiegu zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego. Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, co ułatwia jej usuwanie. Po podaniu miejscowym do ucha, lek nie wywiera działania ogólnoustrojowego.

Dawkowanie

- Lek stosuje się wyłącznie miejscowo, do ucha.
- Lek przeznaczony jest do stosowania u osób dorosłych.
- W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe należy zwrócić się do lekarza.
- W celu krótkotrwałego leczenia miejscowych objawów ostrego zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego: zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin.
- Bez zalecenia lekarza, nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni.
- W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha: zwykle od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez cztery dni.

Skład

- Substancją czynną leku jest salicylan choliny.
- Pozostałe składniki to: glicerol, etanol 96%, chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (salicylan choliny), inne salicylany (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna) lub na którykolwiek z pozostałych składników

tego leku;

- Krwawienie lub wyciek z ucha;
- Silny ból ucha wraz z pogorszeniem słuchu;
- Jeśli u pacjenta wcześniej rozpoznano uszkodzenie błony bębenkowej (pęknięcie lub przerwanie jej ciągłości).
- Osoby w wieku poniżej 18 lat.

Działania niepożądane

Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry).

U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania leku może dojść do uszkodzenia słuchu.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W oryginalnym opakowaniu.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.