

Ototalgin 0,2 g/g krople do uszu, 10 g



Cena: 22,79 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,2 g/g
Opakowanie	10 g
Postać	krople do uszu
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Cholini salicylas

Opis produktu

Wskazania

Lek przeznaczony dla pacjentów dorosłych. Do stosowania doraźnego w stanach zapalnych zewnętrznego przewodu słuchowego objawiających się bólem, świądem, zaczerwienieniem. Lek zalecany do zmiękczenia i usuwania woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego.

Działanie

Lek zawiera pochodną kwasu salicylowego – salicylan choliny. Salicylan choliny, zastosowany miejscowo, ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Zawarty w leku glicerol zmiękcza woskowinę w uchu, ułatwiając jej usunięcie.

Dawkowanie

- Do stosowania miejscowego do ucha.
- Dorośli: zalecana dawka: 3-4 krople leku należy zakraplać do chorego ucha 2-4 razy na dobę.

Skład

Substancją czynną leku jest salicylan choliny.

Substancje pomocnicze to: glicerol, etanol (96%), chlorobutanol półwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość (alergie) na salicylan choliny lub salicylany (np. kwas acetylosalicylowy/aspiryna), lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- W przypadku wcześniejszego rozpoznania uszkodzenia błony bębenkowej;
- W przypadku występowania krwawienia lub wycieku z ucha;
- W przypadku występowania silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić objawy nadwrażliwości (np. podrażnienie skóry).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Lek przeznaczony do stosowania doraźnego, nie dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeżeli pojawią się dodatkowe objawy, świadczące o rozwijającym się procesie chorobowym (gorączka, wyciek z ucha) lub po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wystąpienia nawrotów choroby, o zastosowaniu tego leku powinien zdecydować lekarz.

Lek ten może maskować objawy innych schorzeń przewodu słuchowego i utrudnić ich prawidłową diagnozę. Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku.

Lek zawiera konserwant chlorobutanol półwodny.

- Lek Ototalgin a inne leki: należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Lek stosowany miejscowo, nie wykazuje działania ogólnego. Jednoczesne stosowanie z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (np. aspiryna, ibuprofen) może nasilać działanie miejscowe.

- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.
- Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn: lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.