

Otrivin 1 mg/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 24,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	1 mg/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Opis

Otrivin 1 mg/ml, aerozol do nosa, wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat. Substancją czynną leku jest ksylometazolini chlorowodorek. Działanie leku rozpoczyna się w ciągu 2 minut i utrzymuje się do dwunastu godzin.

Wskazania

- Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
- Lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych.
- Dzięki zmniejszeniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
- Ułatwia wziętnikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

Działanie

Obkurczanie naczyń krwionośnych zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa oraz ilość wydzieliny. Ułatwia oddychanie przez nos. Zapobiega wysychaniu i podrażnieniu błony śluzowej nosa.

Dawkowanie

- Podanie donosowe.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę.
- Nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.

Skład

Substancją czynną leku Otrivin jest ksylometazolini chlorowodorek. Jeden ml roztworu zawiera 1 mg ksylometazolini chlorowodoru. Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, sodu diwodorofosforan dwuwodny, disodu fosforan dwunastowodny, sodu chlorek, sorbitol 70%, hypromeloza 4000, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na ksylometazoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent przeżył operację wykonywaną przez nos, np. usunięcie przysadki lub operację przebiegającą z odsłonięciem opony twardej (operacja mózgu wykonywana przez nos lub usta).
- Jaskra z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku).
- Jeśli u pacjenta błona śluzowa nosa jest bardzo sucha (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

- Częste działania niepożądane (występują u 1 do 10 na 100 pacjentów): suchość lub podrażnienie błony śluzowej nosa, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania.
- Bardzo rzadkie działania niepożądane (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów): reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiaraowa lub przyspieszona czynność serca.
- Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych, które mogą być objawami reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, świąd z czerwoną wysypką lub pęcherzami. Objawy te występują bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób stosujących lek).

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 30°C.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Otrivin należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, choroby serca, nadczynności tarczycy, cukrzycy, rozrostu gruczołu krokowego, łagodnego nowotworu nadnercza, który wytwarza duże ilości adrenaliny i noradrenaliny (guz chromochłonny), przyjmowania niektórych leków przeciwdepresyjnych znanych jako inhibitory monoaminooksydazy (IMAO) lub w przypadku przyjmowania ich w ciągu ostatnich 2 tygodni, nadwrażliwości na substancje o działaniu podobnym do ksylometazoliny. U wrażliwych pacjentów lek może powodować bezsenność, zawroty głowy, nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi lub drżenie.

- Leku nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni. Jeśli objawy nadal utrzymują się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy stosować leku w przypadku przyjmowania niektórych leków stosowanych w leczeniu depresji. Są to: inhibitory monoaminooksydazy (IMAO): NIE należy stosować leku w przypadku jednoczesnego stosowania inhibitorów IMAO lub stosowania takich leków w ciągu ostatnich 14 dni, trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne.
- Nie należy stosować leku w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.