

Otrivin ipra Max (0,5 mg + 0,6 mg)/ml, aerozol do nosa, 10 ml



Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	(0,5mg+0,6mg)/ml
Opakowanie	10 ml
Postać	aerozol do nosa
Producent	NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Xylometazolini hydrochloridum, Ipratropii bromidum
Wiek	od 18 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Leczenie przekrwienia błony śluzowej nosa z wodnistą wydzieliną z nosa (katar), związanych z przeziębieniem.

Działanie

Lek zmniejsza katar i przekrwienie błony śluzowej.

Dawkowanie

- Dorośli: jedna dawka aerozolu do każdego otworu nosowego, do 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 7 dni. Należy zachować co najmniej 6-godzinny odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami.
- Nie należy przekraczać 3 aplikacji do każdego otworu nosowego na dobę. Jeśli objawy choroby zmniejszą się, zaleca się przerwanie leczenia, nawet jeśli trwało ono krócej niż 7 dni, w celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych.

Skład

Substancjami czynnymi leku są ksylometazolini chlorowodorek i ipratropiowy bromek.

1 ml leku zawiera 0,5 mg ksylometazolini chlorowodoru i 0,6 mg ipratropiowego bromku.

1 dawka leku zawiera 70 mikrogramów ksylometazolini chlorowodoru i 84 mikrogramy ipratropiowego bromku.

Pozostałe składniki leku to: disodu edetynian, glicerol 85%, woda oczyszczona, sodu wodorotlenek i kwas solny stężony.

Przeciwwskazania

- Dzieci w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
- Uczulenie na ksylometazolini chlorowodorek lub ipratropiowy bromek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Uczulenie na atropinę lub substancje podobne, np. hioscyjaminę i skopolaminę.
- Jeśli pacjent miał usuwany gruczoł przysadkowy podczas operacji wykonywanej przez nos.
- Jeśli pacjent miał operację mózgu przeprowadzoną przez nos lub jamę ustną.

- Jaskra (zwiększone ciśnienie w oku).
- Bardzo sucha błona śluzowa nosa (wysychające zapalenie błony śluzowej nosa).

Działania niepożądane

- Należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza, jeśli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów: kołatanie serca i przyspieszone bicie serca (występuje rzadziej niż u 1 na 100 osób), objawy reakcji alergicznej, takie jak trudności w oddychaniu, mówieniu lub przełykaniu; obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła; silne swędzenie skóry z czerwoną wysypką lub guzkami (częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych), zaburzenia widzenia (w tym niewyraźne widzenie, zaostrenie jaskry lub wzrost ciśnienia w oku), widzenie tęczyowych obwódok wokół źródła jasnego światła i (lub) ból oka (częstość nieznana,

nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

- Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi są krwawienie z nosa i suchość błony śluzowej nosa. Wiele ze zgłoszonych objawów niepożądanych to również objawy przeziębienia.
- Bardzo częste działania niepożądane (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): krwawienie z nosa, suchość błony śluzowej nosa.
- Częste działania niepożądane (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): uczucie dyskomfortu w nosie, przekrwienie błony śluzowej nosa, suchość i podrażnienie gardła, ból nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaburzenia smaku, ból głowy.
- Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów): owrzodzenie nosa, kichanie, ból gardła, kaszel, chrypka; rozstrój żołądka, nudności; zmienione czucie zapachu, zawroty głowy, drżenie; dyskomfort, zmęczenie; bezsenność; podrażnienie oczu, suchość oczu.
- Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): katar.
- Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): wysypka, pokrzywka; uczucie dyskomfortu w okolicy nosa; uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, wzmożone pragnienie; nagły skurcz mięśni gardła; nieregularne tętno; zaburzenia ostrości wzroku, rozszerzenie źrenic; swędzenie; trudności w opróżnianiu pęcherza moczowego.
- W celu zminimalizowania ryzyka działań niepożądanych, takich jak: krwawienie z nosa i inne objawy dotyczące nosa, zaleca się przerwanie stosowania leku, gdy objawy zmniejszą się, nawet jeśli nastąpi to wcześniej niż po 7 dniach.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.