

Ottilan Med, krople do uszu, 15 ml



Cena: 25,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	15 ml
Opakowanie	15 ml
Postać	krople do uszu
Producent	NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Ottilan Med, krople do uszu, które wspomagają leczenie stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego spowodowanych przez infekcje różnego pochodzenia. Zawarty glicerol usuwa nadmiar płynu z tkanek przewodu słuchowego zewnętrznego (efekt osmotyczny) powodując zmniejszenie obrzęku i towarzyszącego mu bólu ucha oraz tworzy barierę ochronną na powierzchni skóry. Obecne w preparacie nanokoloidy srebra o silnym działaniu utleniającym powodują obumarcie drobnoustrojów, a zawarte nanokoloidy miedzi zapobiegają ich rozwojowi.

Zastosowanie

Wspomaganie leczenia stanów zapalnych przewodu słuchowego zewnętrznego spowodowanych infekcjami różnego pochodzenia. dla dorosłych i dzieci powyżej 12 miesiąca życia.

Sposób użycia

- Dzieci i dorośli: podawać do bolącego ucha 1-2 krople maksymalnie trzy razy na dobę.
- Ból ucha powinien zmniejszyć się w ciągu kilku dni od rozpoczęcia stosowania wyrobu medycznego. W przypadku braku poprawy w ciągu 3 dni lub w razie nasilenia się dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. W razie konieczności i wyłącznie po konsultacji z lekarzem wyrób medyczny można stosować przez dłuższy czas.

Skład

Glicerol, nanokoloid srebra, nanokoloid miedzi.

Przechowywanie

- W temperaturze 5 – 25oC.
- Po pierwszym otwarciu opakowania wyrób można stosować nie dłużej niż 30 dni.
- W sposób niedostępny dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Stosowanie wyrobu u kobiet w ciąży i karmiących piersią należy skonsultować z lekarzem.
- Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na glicerol, lub którąkolwiek z zawartych substancji.
- Nie należy stosować w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia uszkodzenia błony bębenkowej.
- Nie należy stosować w przypadku krwawienia lub wycieku z ucha.
- Nie należy stosować w przypadku odczuwania silnego bólu ucha wraz z pogorszeniem słuchu.
- Nie należy stosować u niemowląt poniżej 12 miesięcy.
- Nie stosować u osób bezpośrednio po zabiegach operacyjnych w obrębie ucha.
- Nie stosować do ucha z założonym aparatem słuchowym. Ottilan med należy podawać na około godzinę przed włożeniem aparatu słuchowego do przewodu słuchowego zewnętrznego.
- W przypadku braku poprawy w ciągu 3 dni lub w razie nasilenia się dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Przedłużający się ból lub obrzęk może sygnalizować zakażenie bakteryjne lub grzybicze, które wymaga konsultacji lekarza oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia.
- Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.