


# Oviderm krem zmiękczejący 250 mg/g, 500 g



Cena: 99,99 zł

## Opis słownikowy

Cena jednostkowa	500 g
Dawka	250 mg/g
Opakowanie	500 g
Postać	krem
Producent	REIG JOFRE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Propylenoglycolum

## Opis produktu

### Opis

Oviderm jest lekiem w formie kremu zawierającym glikolem propylenowym. Glikol propylenowy ma właściwości wiązania wody, a także w niewielkim stopniu działa przeciwdrobnoustrojowo na niektóre bakterie i grzyby.

### Wskazania

Oviderm jest stosowany do leczenia suchej skóry

### Sposób użycia

- Krem można stosować w zależności od potrzeby, kilka razy na dobę i zawsze należy go nakładać po kontakcie skóry z wodą.
- Należy nakładać taką ilość kremu, jaką może wchłonąć skóra bez uczucia lepkości.

### Skład

Nie należy stosować leku Oviderm:

- na poparzoną skórę,
- do kanału ucha, ponieważ glikol propylenowy może powodować uszkodzenie ucha,

-jeśli pacjent ma uczulenie na glikol propylenowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

### Przeciwwskazania

- Ze względu na brak dostępnych danych z badań klinicznych dotyczących stosowania produktu nie zaleca się go kobietom w ciąży lub w okresie karmienia piersią. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- W celu uniknięcia niezamierzonego spożycia przez dziecko glikolu propylenowego, podczas karmienia piersią nie nakładać leku Oviderm na piersi lub w ich okolicy.

- Oviderm zawiera alkohol cetostearylowy, może on powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

#### **Działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często: mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 osób

- Przemijające zaostrzenie dolegliwości, swędzenie, pieczenie i zaczerwienienie skóry.
- Reakcje alergiczne, w tym reakcje skórne, takie jak wysypka.

#### **Przechowywanie**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Ze względu na brak dostępnych danych z badań klinicznych dotyczących stosowania produktu nie zaleca się go kobietom w ciąży lub w okresie karmienia piersią. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- W celu uniknięcia niezamierzonego spożycia przez dziecko glikolu propylenowego, podczas karmienia piersią nie nakładać leku Oviderm na piersi lub w ich okolicy.
- Oviderm zawiera alkohol cetostearylowy, może on powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

#### **Dodatkowe informacje**

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.