

Oxalin Junior 0,05%, żel do nosa 0,5 mg/g, 10 g



Cena: 19,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	0,5 mg/g
Opakowanie	10 g
Postać	żel do nosa
Producent	WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Oxymetazolini hydrochloridum
Wiek	od 6 roku życia

Opis produktu

Wskazania

Do stosowania dla dzieci w wieku powyżej 6 lat i dorosłych: w ostrym zapaleniu błony śluzowej nosa; w naczynioruchowym zapaleniu błony śluzowej nosa; w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa; w zapaleniu zatok przynosowych; w zapaleniu trąbki słuchowej; w zapaleniu ucha środkowego.

Działanie

Lek zastosowany miejscowo na błonę śluzową nosa, zwęża naczynia krwionośne, zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i hamuje nadmierne wydzielanie, co ułatwia swobodne oddychanie przez nos. Udrożnia przewody nosowe i ułatwia odpływ wydzieliny z zatok przynosowych. Lek nawilża błonę śluzową nosa, powoduje, że lek nie spływa na dno jamy nosa i do gardła.

Dawkowanie

- Lek stosować wyłącznie do nosa.
- Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
- Nie stosować dłużej niż przez 3 do 5 dni.
- Nie należy stosować dawek większych niż podane poniżej.
- 1 dawka żelu o objętości 0,1 ml zawiera 0,05 mg oksymetazolini chlorowodoru.
- *Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:* 1 dawka do każdego otworu nosowego dwa do trzech razy na dobę. Nie należy stosować leku częściej niż 3 razy na dobę.
- *Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:* 1 dawka do każdego otworu nosowego dwa razy na dobę. Nie należy stosować leku częściej niż 2 razy na dobę.

Skład

- Substancją czynną leku jest oksymetazolini chlorowodorek. 1 g żelu zawiera 0,5 mg oksymetazolini chlorowodoru.
- Pozostałe składniki to: sodu chlorek; disodu fosforan dwunastowodny; sodu diwodorofosforan jednowodny; disodu edetynian; hydroksyetyloceluloza; glicerol; benzalkoniowy chlorek, roztwór; woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- uczulenie na oksymetazolinę chlorowodorek lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa (zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa z tworzeniem się strupów).

Działania niepożądane

Często (u więcej niż 1 na 100 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

- pieczenie w miejscu podania, suchość błony śluzowej nosa, kichanie.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

- kołatanie serca, przyspieszenie czynności serca;
- zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Rzadko (u więcej niż 1 na 10 000 pacjentów, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

- niepokój ruchowy, bezsenność, bóle głowy;
- zmęczenie;
- silne uczucie „zatkania nosa” w wyniku nasilenia obrzęku błony śluzowej nosa (występuje po ustaniu działania leku, jako objaw tzw. przekrwienia reaktywnego).

Przechowywanie

- Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.
- Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Nie stosować leku po upływie 12 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.