

Panadol 120 mg/5 ml, zawiesina doustna dla dzieci smak truskawkowy, 100 ml



Cena: 26,99 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 ml
Dawka	120 mg/5 ml
Opakowanie	100 ml
Postać	zawiesina doustna
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Wskazania

- Gorączka i ból występujące, np.: w czasie przeziębień i grypy, po szczepieniach.
- Bóle różnego pochodzenia, np.: bolesne ząbkowanie, ból zębów, ból głowy, ból gardła, ból ucha.

Działanie

Przeciwgorączkowe i przeciwbólowe.

Dawkowanie

- Dawkowanie ustala się wg masy ciała dziecka.
- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Masa ciała 6 kg, dawka jednorazowa 3,5 ml, wiek 3 miesiąca,
- Masa ciała 8 kg, dawka jednorazowa 5,0 ml, wiek 6 miesięcy,
- Masa ciała 9 kg, dawka jednorazowa 5,5 ml, wiek 9 miesięcy,
- Masa ciała 10 kg, dawka jednorazowa 6,0 ml, wiek 1 rok,
- Masa ciała 12,5 kg, dawka jednorazowa 8,0 ml, wiek 2 lata,
- Masa ciała 15 kg, dawka jednorazowa 9,0 ml, wiek 3 lata,
- Masa ciała 17 kg, dawka jednorazowa 10,5 ml, wiek 4 lata,
- Masa ciała 19 kg, dawka jednorazowa 12,0 ml, wiek 5 lat,
- Masa ciała 21 kg, dawka jednorazowa 13,0 ml, wiek 6 lat,

- Masa ciała 30 kg, dawka jednorazowa 19,0 ml, wiek 9 lat,
- Masa ciała 42 kg, dawka jednorazowa 26,0 ml, wiek 12 lat.

- Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 3 miesięcy.
- Przed podaniem leku dziecku poniżej 2 roku życia wskazany jest kontakt z lekarzem.
- Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować dłużej niż 3 dni.
- Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.
- Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Skład

5 ml zawiesiny Panadol dla dzieci zawiera:

substancja czynna: paracetamol 120 mg,

substancje pomocnicze: kwas jabłkowy, azorubina, guma ksantan, maltitol ciekły, aromat truskawkowy, sorbitol 70% (krystalizujący), metylu parahydroksybenzoesan sodowy, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu hydroksybenzoesan sodowy, sorbitol, kwas cytrynowy bezwodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nie stosować jednocześnie innych leków zawierających paracetamol.
- Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Niewydolności wątroby lub nerek u dziecka.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.