

Panadol Femina 500 mg + 10 mg, 10 tabletek powlekanych

Cena: 17,90 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg + 10 mg
Opakowanie	10 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum, Hyoscini butylbromidum
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

U dorosłych i młodzieży powyżej 12 lat w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości związanych z:

- bolesnym miesiączkowaniem,
- kolką nerkową, wątrobową,
- zespołem drażliwego jelita.

Działanie

- Paracetamol stosowany jest do łagodzenia bólu i obniżania gorączki.
- Butylobromek hioscyny znosi stany skurczowe w obrębie przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego.

Dawkowanie

- Lek do podawania doustnego. Lek można stosować niezależnie od posiłków.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 do 2 tabletek (co odpowiada 500 - 1000 mg paracetamolu i 10 - 20 mg butylobromku hioscyny). Jeżeli jest to wskazane stosować maksymalnie 3 razy na dobę, co 8 godzin. Nie stosować więcej niż 6 tabletek na dobę (co odpowiada 3000 mg paracetamolu i 60 mg butylobromku hioscyny).
- Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla dorosłych podczas leczenia krótkotrwałego wynosi 4000 mg, a podczas leczenia długotrwałego 2600 mg.
- Bez konsultacji z lekarzem leku nie należy stosować regularnie dłużej niż przez 3 dni.

Skład

Substancjami czynnymi leku są paracetamol i hioscyny butylobromek.

Jedna tabletkę powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 10 mg hioscyny butylobromku.

Pozostałe składniki to: celuloza mikrokryształiczna, skrobia ziemniaczana, powidon K30, sorbitol, talk, magnezu stearynian, krzemionka

koloidalna bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, hypromeloza, makrogol 6000.

Przeciwwskazania

- Uczulenie na atropinę, paracetamol lub na którykolwiek ze składników leku,
- Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby (głównie u pacjentów z alkoholowym uszkodzeniem wątroby) lub nerek,
- Choroba alkoholowa,
- Niedokrwistość oraz wrodzony brak enzymu zwanego dehydrogenazą glukozo-6-fosforanową (fawizm),
- Jeśli pacjent ma miastenię (osłabienie mięśni),
- Jaskra (choroba oczu z postępującym uszkodzeniem nerwu wzrokowego),
- Przerost gruczołu krokowego powodujący zatrzymywanie moczu,
- Przewężenia w przewodzie pokarmowym,
- Zaburzenia rytmu serca przebiegające z przyspieszeniem czynności serca.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

- methemoglobinemia (obecność utlenionej hemoglobiny we krwi), agranulocytoza (zmniejszenie liczby krwinek białych we krwi), trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi);
- reakcje anafilaktyczne (poważne reakcje alergiczne powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy), wysypki skórne, obrzęk naczynioruchowy (poważna reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła);
- zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze i bolesne nadżerki na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączka i bóle stawowe);
- przebarwienie siatkówki i jaskra;
- tachykardia (szybkie bicie serca), niedociśnienie tętnicze (niskie ciśnienie krwi);
- skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na aspirynę lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne;
- zaburzenia żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności, wymioty; biegunka;
- świąd, pokrzywka, wysypka, rumień, obrzęk naczynioruchowy;
- zaburzenia czynności wątroby;
- zaburzenia czynności nerek.

Ponadto mogą wystąpić: suchość w jamie ustnej; zaburzenia akomodacji oczu (ostrości widzenia); dezorientacja, zaburzenia pamięci, zawroty głowy.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- Chronić od światła.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Panadol Femina pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli:

- ma dolegliwości serca (zwężenie zastawki mitralnej, chorobę tętnic wieńcowych) lub ostry zawał serca,
 - ma owrzodzenie jelit (lek może osłabiać ruchy jelit i powodować zaparcia),
 - ma refluks żołądkowo-przełykowy (cofanie się zawartości żołądka do przełyku), inne przewlekłe zaburzenia ruchomości mięśni gładkich górnego odcinka przewodu pokarmowego lub zwężenie odźwiernika,
 - jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat), ponieważ lek może powodować zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, suchość w jamie ustnej oraz zatrzymanie moczu (szczególnie mężczyzn),
 - ma niewydolność wątroby i (lub) nerek,
 - głodzi się i regularnie pije alkohol, ponieważ jest szczególnie narażony na uszkodzenie wątroby,
 - jest uczulony na pochodne kwasu acetylosalicylowego (pochodne aspiryny), ponieważ może być również uczulony na paracetamol.
-
- Jeśli pacjent stwierdzi jakiegokolwiek zaburzenia ostrości widzenia lub ból w gałce ocznej spowodowany podwyższeniem ciśnienia, powinien przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem.
 - Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 - W czasie stosowania leku nie należy pić alkoholu.

- Nie należy stosować leku u kobiet karmiących.
- Nie należy stosować leku u kobiet ciężarnych.
- Lek może wywoływać objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego i zaburzać ostrość widzenia (proces akomodacji oka), dlatego w trakcie jego stosowania nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchu.
- Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.