

Papilocare żel dopochwowy, 5ml x 7 aplikatorów



Cena: 87,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	5ml x 7 aplikatorów
Postać	żel dopochwowy
Producent	GEDEON RICHTER PLC.
Rejestracja	Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu

Opis

Papilocare żel przyspieszający reepitalizację (odbudowę nabłonka) w obrębie strefy przekształceń nabłonka szyjki macicy stosowany w profilaktyce i wspomaganiu leczenia zmian wywołanych przez wirus HPV.

Zastosowanie

Wspomaga:

- leczenie suchości błony śluzowej pochwy,
- procesy kontroli i reepitalizacji (odbudowy) strefy przekształceń nabłonkowych szyjki macicy w celu zapobiegania ryzyku występowania śród nabłonkowych zmian małego stopnia (LSIL) wywołanych przez wirus HPV,
- leczenie zmian śród nabłonkowych wywołanych przez wirus HPV,
- naprawę i reepitalizację uszkodzeń błony śluzowej szyjki macicy i pochwy,
- przywrócenie równowagi mikrobiologicznej pochwy,
- poprawę ogólnego stanu pochwy,
- stworzenie warunków do szybkiego gojenia się uszkodzeń na skutek drapania spowodowanego świądem i pieczeniem.

Sposób użycia

Aplikator służy do jednorazowego użycia, zawartość należy stosować dopochwowo, najlepiej wieczorem przed snem. Ścisnąć opakowanie tak, aby opróżnić zawartość aplikatora i delikatnie wyjąć. Nie podmywać się. Wyrzucić jednorazowy aplikator. Zaleca się stosowanie raz dziennie przez 21 dni, a następnie co drugi dzień, w zależności od zaleceń lekarza.

Skład

Niosomy kwasu hialuronowego, Niosomy β -glukanu, Fitosomy wąkrotki azjatyckiej (Centella Asiatica), BioEcolia, Aloes (Aloe Vera), Wrośniak różnobarwny (Coriolus Versicolor), Wyciąg z miodly indyjskiej (Neem).

Przechowywanie

- W chłodnym i suchym miejscu.
- W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
- Jeżeli po zastosowaniu występują dolegliwości związane z użyciem produktu, należy zaprzestać stosowania i skonsultować się z lekarzem.
- W przypadku ciąży należy skonsultować się z lekarzem.