

# Paracetamol Accord 500 mg, 50 tabletek



Cena: 7,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	50 tabletek
Producent	ACCORD HEALTHCARE LTD
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Leczenie łagodnego i umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

### Działanie

Przeciwbólowe.

### Dawkowanie

- Dorośli i młodzież powyżej 15 lat (> 55 kg masy ciała): 1 lub 2 tabletki (500-1000 mg paracetamolu), jeśli jest to konieczne, można powtarzać co 4 do 6 godzin, aż do 6 tabletek (3000 mg paracetamolu) w ciągu 24 godzin.
- Dzieci w wieku od 6 do 9 lat (o masie ciała 22-30 kg): połowa tabletki (250 mg paracetamolu), maksymalnie 4 do 6 razy w ciągu 24 godzin. Tabletkę można podzielić na równe dawki.
- Dzieci w wieku od 9 do 12 lat (o masie ciała 30-40 kg): 1 tabletki (500 mg paracetamolu), maksymalnie 3 do 4 razy w ciągu 24 godzin.
- Dzieci w wieku od 12 do 15 lat (o masie ciała 40-55 kg): 1 tabletki (500 mg paracetamolu), maksymalnie 4-6 razy w ciągu 24 godzin.

Skuteczna dawka dobową nie powinna przekraczać 60 mg paracetamolu/kg mc./dobę (do 2 g paracetamolu/dobę) w następujących przypadkach dorośli o masie ciała mniejszej niż 50 kg, łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta (rodzinna niehemolityczna żółtaczka), odwodnienie, długotrwałe niedożywienie.

- Tabletkę należy połykać w całości popijając dużą ilością wody. Ewentualnie, rozpuścić tabletkę w dużej ilości wody, dobrze wymieszać i wypić.
- Pomiędzy dwoma kolejnymi dawkami należy zachować minimum 4 godzinny odstęp.
- Nie stosować w połączeniu z innymi preparatami zawierającymi paracetamol.
- Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gdy gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, objawy nasilą się lub pojawiają się inne

objawy, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

#### Skład

Substancją czynną leku jest paracetamol. Każda tabletkę zawiera 500 mg paracetamolu.

Inne składniki leku to: skrobia kukurydziana, żelatyna, krzemionka koloidalna bezwodna, talk, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
- Dzieci poniżej 6 lat.

#### Działania niepożądane

Rzadkie działania niepożądane: występują u 1 do 10 pacjentów na 10 000: niektóre choroby krwi, w tym: agranulocytoza, małopłytkowość, plamica małopłytkowa, niedokrwistość hemolityczna, leukopenia, zaburzenia płytek krwi (zaburzenia krzepnięcia) i zaburzenia komórek macierzystych (zaburzenia powstawania komórek krwi w szpiku kostnym). Reakcje alergiczne. Depresja, dezorientacja, omamy. Drżenie, bóle głowy. Zaburzenia widzenia. Obrzęk (nieprawidłowe nagromadzenie płynu pod skórą). Ból brzucha, krwawienie z jelit lub żołądka, biegunka, nudności, wymioty. Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczkę (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby (obumieranie komórek wątrobowych). Wysypka, świąd, nadmierne pocenie się, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy z objawami takimi jak obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie, interakcje z lekami. Przedawkowanie i zatrucia.

- Bardzo rzadkie działania niepożądane: występują u mniej niż 1 pacjenta na 10 000: Pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek). Reakcje alergiczne, gdzie należy przerwać leczenie, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia tętniczego, wstrząs i anafilaksja. Niski poziom glukozy we krwi. Hepatotoksyczność (uszkodzenie wątroby przez substancje chemiczne). Mętny mocz i zaburzenia nerek. Skurcz oskrzeli (trudności w oddychaniu) u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne leki przeciwzapalne. Krwimocz (krew w moczu). Bezmocz (niemożność oddawania moczu).
- Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych): ostra uogólniona osutka krostkowa (wysypka charakteryzująca się obecnością licznych, małych, głównie niepęcherzykowych, jałowych krost). Ciężka wysypka lub złuszczenie się skóry. Zespół Stevensa-Johnsona (ciężka choroba skóry zagrażająca życiu). Zacerwienie skóry, pęcherze lub wysypka spowodowana przyjęciem paracetamolu.

#### Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.