

Paracetamol Hasco 125 mg, 10 czopków doodbytniczych



Cena: 5,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	125 mg
Opakowanie	10 czopków doodbytniczych
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

Opis produktu

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Stosować doodbytniczo.
- Dorośli: dawka 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni. U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe:

3 miesiące – 1 rok - 80 mg,
2–3 lata - 125 mg,
4–6 lat - 125 mg do 250 mg,
7–8 lat - 250 mg,
9–10 lat - 250 mg do 500 mg,
11–12 lat - 500 mg.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie więcej niż 4 razy na dobę.

U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować tylko z przepisu lekarza.

Skład

- Substancją czynną leku jest paracetamol. Jeden czopek zawiera 125 mg paracetamolu.
- Pozostały składnik (substancja pomocnicza) to: tłuszcz stały (Witepsol S58).

Przeciwwskazania

- Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
- Choroba alkoholowa,
- Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko ($<1/10\ 000$): agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.
- Zaburzenia układu oddechowego: rzadko ($\geq 1/10\ 000$ do $<1/1\ 000$): obrzęk krtani.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.
- Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka). Bardzo rzadko: uczulenie.
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.