

# Paracetamol Hasco 500 mg, czopki, 10 czopków doodbytniczych



Cena: 6,90 zł

## Opis słownikowy

Dawka	500 mg
Opakowanie	10 czopków doodbytniczych
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum

## Opis produktu

### Wskazania

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

### Działanie

Przeciwbólowe i przeciwgorączkowe.

### Dawkowanie

- Stosować doodbytniczo.
- U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni. U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

### Dawki jednorazowe:

- 3 miesiące – 1 rok - 80 mg,
- 2–3 lata - 125 mg,
- 4–6 lat - 125 mg do 250 mg,
- 7–8 lat - 250 mg,
- 9–10 lat - 250 mg do 500 mg,
- 11–12 lat - 500 mg.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie więcej niż 4 razy na dobę. U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.

U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować tylko z przepisu lekarza.

#### Skład

1 czopek zawiera 500 mg Paracetamolium (paracetamol) i substancję pomocniczą: tłuszcz stały (Witepsol S58).

#### Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na paracetamol, ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby, choroba alkoholowa, ciężka niewydolność nerek.

#### Działania niepożądane

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko (<1/10 000): agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.

- Zaburzenia układu oddechowego

Rzadko ( $\geq$ 1/10 000 do <1/1 000): obrzęk krtani.

- Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.

- Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka).

Bardzo rzadko: uczulenie.

- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

#### Przechowywanie

- W temperaturze poniżej 25°C.
- W opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.
- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
- Bez zalecenia lekarza nie stosować: przeciwbólowo dłużej niż 10 dni u dorosłych i 3 dni u dzieci; w przypadku bólu gardła dłużej niż 2 dni; w przypadku nawracającej lub wysokiej gorączki dłużej niż 3 dni.
- W czasie stosowania paracetamolu nie należy pić napojów alkoholowych; nie stosować leku u osób uzależnionych od alkoholu.
- Stosować ostrożnie u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby występuje u osób głodzonych. U pacjentów z astmą, uczulonych na kwas salicylowy może wystąpić uczulenie na paracetamol.
- Ciąża i okres karmienia piersią: stosowanie po konsultacji z lekarzem.
- Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.