

Paracetamol Hasco 80 mg, czopki doodbytnicze, 10 czopków doodbytniczych



Cena: 5,50 zł

Opis słownikowy

Dawka	80 mg
Opakowanie	10 czopków doodbytniczych
Postać	czopki doodbytnicze
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolium

Opis produktu

Wskazania

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

- Czopki stosuje się doodbytniczo.
- U dorosłych stosuje się dawkę 500 mg jednorazowo. Maksymalna dawka dobową paracetamolu dla osób dorosłych w przypadku leczenia krótkotrwałego wynosi 4,0 g, a długotrwałego 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.
- U dzieci dawkę ustala się wg masy dziecka (przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg/kg masy ciała) lub według poniższej tabeli wiekowej.

Dawki jednorazowe

- 3 miesiące-1 rok - 80 mg,
- 2-3 lata - 125 mg,
- 4-6 lat - 125 mg do 250 mg,
- 7-8 lat - 250 mg,
- 9-10 lat - 250 mg do 500 mg,
- 11-12 lat - 500 mg.

W razie potrzeby dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie więcej niż 4 razy na dobę.
U dzieci nie stosować leku dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować tylko z przepisu lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Skład

1 czopek zawiera: substancję czynną: paracetamol 80 mg, substancję pomocniczą: tłuszcz stały (Witepsol S58).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na paracetamol,
- Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
- Choroba alkoholowa,
- Ciężka niewydolność nerek.

Działania niepożądane

W dawkach leczniczych paracetamol jest stosunkowo mało toksyczny.

- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: bardzo rzadko (< 1/10 000) : agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość.
- Zaburzenia układu oddechowego: rzadko (>1/10 000 do <1/1000) : obrzęk krtani.
- Zaburzenia nerek i dróg moczowych: bardzo rzadko: kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz.
- Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko: obrzęk naczyńioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: spadek ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka). Bardzo rzadko: uczulenie.
- Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: bardzo rzadko: zapalenie wątroby.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.