

# Paracetamol Hasco o smaku pomarańczowym, 120 mg/5 ml, zawiesina doustna, 150 g



Cena: 17,91 zł

## Opis słownikowy

Dawka	120 mg/5ml
Opakowanie	150 g
Postać	zawiesina doustna
Producent	PRZEDS. PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamolum
Wiek	od 1 dnia życia

## Opis produktu

### Wskazania

- Gorączka i bóle różnego pochodzenia (np. po zabiegach chirurgicznych, bóle związane z wyrzynaniem się zębów, bóle głowy o łagodnym lub umiarkowanym

nasileniu) oraz dolegliwości towarzyszące reakcji organizmu na szczepionkę (ból, gorączka, odczyn miejscowy).

- Ponadto lek stosuje się u niemowląt od 0 do 3 miesiąca życia do leczenia objawowego gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni oraz bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego.

### Działanie

- Przeciwgorączkowe.
- Przeciwbólowe.

### Dawkowanie

- Lek stosuje się doustnie.
- Przed użyciem energicznie wstrząsnąć w celu uzyskania jednolitej zawiesiny.
- Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.
- Stosowanie u dzieci poniżej 2 lat powinno być zlecone przez lekarza.
- Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, przeciętna jednorazowa dawka paracetamolu wynosi 10 do 15 mg na kilogram masy ciała.
- W razie konieczności dawkę można powtarzać, nie częściej niż co 4-6 godzin, do 4 razy na dobę, czyli maksymalnie 60 mg/kg

mc./dobę.

Wiek (masa ciała dziecka)	Dawka jednorazowa	Dawka Dobowa
od 0 do 3 miesiąca życia (do 4 kg)	2,5 ml (60 mg)	10 ml (240 mg)
od 4 do 8 miesiąca życia (do 7 kg)	4 ml (96 mg)	16 ml (384 mg)
od 9 do 11 miesiąca życia (do 8 kg)	5 ml (120 mg)	20 ml (480 mg)
od 1 do 2 lat (do 10,5 kg)	6,5 ml (156 mg)	26 ml (624 mg)
od 2 do 3 lat (do 13 kg)	8 ml (192 mg)	32 ml (768 mg)
od 4 do 5 lat (do 18,5 kg)	12 ml (288 mg)	48 ml (1152 mg)
od 6 do 8 lat (do 24 kg)	15 ml (360 mg)	60 ml (1440 mg)
od 9 do 10 lat (do 32 kg)	20 ml (480 mg)	80 ml (1920 mg)
od 11 do 12 lat (do 45,6 kg)	28,5 ml (684 mg)	114 ml (2736 mg)

#### Skład

5 ml zawiesiny zawiera 120 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: sacharoza, guma ksantan (E 415), kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sacharyna sodowa (E 954), sodu benzoian (E 211), sodu pirosiarczyn (E 223), aromat pomarańczowy, woda oczyszczona.

#### Przeciwwskazania

- Uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- Ciężka niewydolność wątroby lub wirusowe zapalenie wątroby,
- Ciężka niewydolność nerek,
- Choroba alkoholowa.

#### Działania niepożądane

- Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób): skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.
- Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób): zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia), leukocytów (leukopenia, agranulocytoza); nudności, wymioty, biegunka.
- Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry).

#### Przechowywanie

- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.
- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

#### Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.