

Parafina ciekła Avena, płyn doustny i na skórę, 100 g



Cena: 7,50 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	100 g
Opakowanie	100 g
Postać	płyn doustny i na skórę
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paraffinum

Opis produktu

Wskazania

- Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza).
- Zewnętrznie do nacierania skóry.

Działanie

- Przeczyszczające.
- Natłuszczające.

Dawkowanie

- Podanie na skórę: Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: nacierać skórę niewielką ilością leku według potrzeb.
- Podanie doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli – zwykle przed snem. 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).
- Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6–10 godzinach.

Skład

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
- Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- W ciemnym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem.
- Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować

szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

- Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedożywionych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie).
- Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstość stosowania leku.
- Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią: na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.