

Parafina ciekła, płyn doustny, 100 g

Cena: 7,95 zł



Opis słownikowy

| | |
|-------------------|--|
| Cena jednostkowa | 100 g |
| Opakowanie | 100 g |
| Postać | płyn doustny |
| Producent | LABORATORIUM GALENOWE OLSZTYN SP. Z O.O. |
| Rejestracja | Lek |
| Substancja czynna | Paraffinum liquidum |

Opis produktu

Wskazania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

Działanie

Przeczyszczające.

Dawkowanie

- Doustnie, 1-3 łyżki stołowe (15-45 g) na noc lub rano na czczo.
- Działanie występuje po kilku godzinach od zastosowania.

Skład

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej (Paraffinum liquidum).

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na parafinę ciekłą.
- Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.
- Nie należy stosować u dzieci poniżej 3 roku życia.

Działania niepożądane

- Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: wyciek parafiny z odbytu;
- Zaburzenia żołądka i jelit: świąd odbytu, wtórne zaparcia (wskutek nadużywania i długotrwałego stosowania);
- Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zmiany zapalne i rozplemowi węzłów chłonnych, zwłóknienie zaotrzewnowych węzłów chłonnych podczas długotrwałego stosowania;
- Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: utrata wody i jonów sodu, a w następstwie wtórne zwiększenie wydalania aldosteronu i

utrata jonów potasu prowadząca do hipokaliemii, co może powodować wtórne nasilenie wcześniejszego zaparcia oraz wystąpienie atonii jelit; zaburzenia gospodarki wodnoelektrolitowej u osób w podeszłym wieku, zaburzenia wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E, K.

Przechowywanie

W ciemnym miejscu, w celu ochrony przed światłem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Produkt stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie występowania działania przeczyszczającego w ciągu 1-2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej.
- Dzieciom powyżej 3 roku życia oraz kobietom w ciąży i karmiącym piersią nie podawać bez konsultacji z lekarzem.
- U dzieci i osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek i możliwie krótko (2-3 tygodnie).
- U osób w podeszłym wieku, z uwagi na ryzyko działań niepożądanych należy monitorować czas i częstotliwość stosowania leku.
- Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowania leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia.
- Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedożywionych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.