

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym (2 g + 25 g)/ 100 g, pasta na skórę, 20 g



Cena: 5,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	20 g
Postać	pasta na skórę
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Zinci salicylatis pasta
Wiek	od 12 roku życia

Opis produktu

Wskazania

- Na zmienioną chorobowo skórę jako środek wysuszający i przeciwbakteryjny o słabym działaniu.
- Pomocniczo w niewielkich wykwitach skórnych w przebiegu trądziku młodzieńczego.

Działanie

Wysuszające, przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

- Lek stosuje się na skórę.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Pastę nakładać dokładnie umyтыми dłońmi lub za pomocą jałowej gazy 1-2 razy dziennie. Po nałożeniu pasty należy dokładnie umyć ręce.

Skład

100 g leku zawiera:

Substancje czynne: Acidum salicylicum (kwas salicylowy) 2 g, Zincum oxidum (cynku tlenek) 25 g.

Substancje pomocnicze: skrobia pszeniczna, wazelina biała.

Przeciwwskazania

- Ostre stany zapalne skóry, nadwrażliwość na kwas salicylowy lub inne składniki produktu.
- Nie stosować na uszkodzoną skórę, w obrębie skóry owłosionej oraz na rany i owrzodzenia.
- Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Przechowywanie

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C. Chronić od światła.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Przed użyciem u dzieci poniżej 12 lat zaleca się zasięgnąć opinii lekarza.
- Nie należy stosować na duże powierzchnie skóry, a jedynie na miejsca zmienione chorobowo.
- Jeśli objawy nie ustąpią lub nasilą się, należy skontaktować się z lekarzem.
- Należy unikać kontaktu z oczami.
- Osoby z astmą oskrzelową powinny przed zastosowaniem leku zasięgnąć opinii lekarza.
- Ciąża i karmienie piersią: przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.