

Pedipur 200 mg/ g, puder leczniczy, 60 g



Cena: 18,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	200 mg/ g
Opakowanie	60 g
Postać	puder leczniczy
Producent	PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE PROLAB SP. Z O.O., PATEREK
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Methenaminum

Opis produktu

Opis

Pedipur 200 mg/ g, puder leczniczy, zawiera substancję czynną metenaminę, która swoje działanie zawdzięcza uwolnionemu wskutek kontaktu z kwaśnym potem, aldehydowi mrówkowemu, który osłabia czynność gruczołów potowych oraz hamuje aktywność bakterii, przez co zmniejsza wydzielanie potu i hamuje jego rozkład przez bakterie.

Wskazania

Nadmierna potliwości stóp i dłoni.

Działanie

- Wysuszające.
- Bakteriobójczo i ściągająco.
- Likwiduje przykry zapach potu.

Dawkowanie

- Stosować miejscowo na skórę.
- Przed użyciem preparat należy wstrząsnąć.
- Umyć starannie skórę nóg lub dłoni i wysuszyć. Nanieść niewielką ilość Pedipuru na skórę nóg lub dłoni, wcierać i pozostawić do wyschnięcia.
- Stosować nie częściej niż 1 – 2 razy w tygodniu.
- Po uzyskaniu poprawy zabiegi można stosować profilaktycznie co 14-20 dni.

Skład

Substancja czynna: metenamina.

1 g pudru zawiera 200 mg metenaminy.

Pozostałe składniki leku to: talk, cynku tlenek, glicerol 86%, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na metenaminę lub inne składniki leku.
- Nie stosować na błony śluzowe.
- Otwarte rany.
- Nie stosować na powierzchnie ciała pozbawione naskórka.
- Owrzodzenia.

Działania niepożądane

Długotrwałe stosowanie może spowodować miejscowe odczyny alergiczne skóry nóg i dłoni.

Przechowywanie

- W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

0 W szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ze względu na ryzyko inaktywacji nie stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, azotany), kwasami i solami o odczynie kwaśnym, węglany (magnezowy, wapniowy).

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.