

# Pelafen 20 mg, od 6 roku życia, 30 tabletek powlekanych



Cena: 23,99 zł

## Opis słownikowy

Dawka	20 mg
Opakowanie	30 tabletek powlekanych
Postać	tabletki powlekane
Producent	PHYTOPHARM KLĘKA S.A.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Pelargonii radicis extractum siccum
Wiek	od 6 roku życia

## Opis produktu

### Wskazania

Lek stosowany w objawowym leczeniu przeziębienia.

### Działanie

Pelafen jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach wynikających wyłącznie z długotrwałego stosowania.

### Dawkowanie

- Stosować doustnie. Połykać w całości, popijając niewielką ilością wody. Nie rozgryzać.
- Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletkę 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).
- Dzieci w wieku 6- 12 lat: 1 tabletkę 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
- Dzieci poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania produktu u dzieci poniżej 6 lat.
- Jeśli mimo stosowania leku objawy nie ustępują w ciągu 1 tygodnia, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

### Skład

Jedna tabletkę powlekana zawiera 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) - Pelargonii radicis extractum siccum (4-7:1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 14% (V/V).  
Substancje pomocnicze wchodzące w skład tabletki:

- Ekstrakt: celuloza sproszkowana, krzemionka koloidalna bezwodna.
- Rdzeń tabletki: celuloza mikrokryształiczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.
- Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 6000, żelaza tlenek żółty E172, żelaza tlenek czerwony E 172, tytanu dwutlenek E 171, talk.

### Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

**Działania niepożądane**

Podczas stosowania leku Pelafen obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania była bardzo rzadka (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób).

Odnotowano również przypadki toksycznego działania na komórki wątroby. Ich częstotliwość nie jest znana.

**Przechowywanie**

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- W przypadku wystąpienia duszności, gorączki, odkrztuszania krwistej lub ropnej wydzieliny lub gdy objawy choroby nie ustąpią w ciągu tygodnia, należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie należy przekraczać zalecanej dziennej dawki.
- Odnotowano przypadki toksycznego działania na komórki wątroby i zapalenia wątroby podczas stosowania leku. W przypadku wystąpienia objawów hepatotoksyczności należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci poniżej 6 lat.
- Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

**Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.