

Pelavo Gardło, spray, 30 ml



Cena: 34,95 zł

Opis słownikowy

Cena jednostkowa	30 ml
Opakowanie	30 ml
Postać	spray
Producent	USP ZDROWIE SP. Z O.O
Rejestracja	wyrób medyczny inny

Opis produktu

Opis

Pelavo Gardło, wyrób medyczny w postaci spray, przeznaczony dla dzieci już po 1 roku życia, młodzieży i dorosłych. Hialuronian sodu intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną śluzówkę, przynosi ulgę gardłu. Porost islandzki, ekstrakt z malwy i lipy, które chronią i osłaniają zakończenia nerwów czuciowych odpowiedzialnych za wywoływanie bólu gardła i odruchu kaszlu. Działają powlekająco i nawilżająco na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.

Zastosowanie

- Wspomaga gardło podczas terapii stanu zapalnego gardła i migdałków.
- Łagodzi suchy kaszel, chrypkę i ból gardła. Intensywnie nawilża wysuszoną i podrażnioną błonę śluzową jamy ustnej i gardła.
- Może być stosowany wspomagająco przy infekcjach o podłożu wirusowym czy bakteryjnym.

Sposób użycia

- Dzieci od 1. roku życia: rozpylić 1–2 dawki sprayu na tylną ścianę gardła. Stosować po posiłku, kilka razy dziennie.
- Dorośli: rozpylić 2–3 dawki sprayu na tylną ścianę gardła. Stosować po posiłku, kilka razy dziennie.
- W razie wątpliwości lub gdy objawy utrzymują się przez czas dłuższy niż 7 dni należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy stosować wyrobu po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
- Przed użyciem, wskazane jest każdorazowe, intensywne wstrząśnięcie butelką.

Skład

Woda demineralizowana, ksylitol, porost islandzki, wyciąg z malwy, wyciąg z lipy, hialuronian sodu, aromat cytrynowy, chlorek benzalkoniowy, wersenian dwusodowy, gliceryna.

Przechowywanie

W oryginalnym opakowaniu, w temperaturze 15-25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (alergii) na jakikolwiek składnik wyrobu.

Dodatkowe informacje

- Preparat należy stosować po posiłku, rozpylając na tylną ścianę gardła.
- Ze względów higienicznych oraz w celu uniknięcia przeniesienia infekcji zalecane jest używanie jednego wyrobu przez jedną osobę.
- U dzieci powyżej 1 roku życia. wyrób medyczny powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.