

# Pelavo Med 20 mg/4 ml, roztwór doustny, 100 ml



Cena: 31,95 zł

## Opis słownikowy

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Cena jednostkowa  | 100 ml                              |
| Dawka             | 20 mg/4 ml                          |
| Opakowanie        | 100 ml                              |
| Postać            | roztwór doustny                     |
| Producent         | US PHARMACIA SP. Z O.O.             |
| Rejestracja       | Lek                                 |
| Substancja czynna | Pelargonii radicis extractum siccum |
| Wiek              | od 6 roku życia                     |

## Opis produktu

### Opis

Pelavo Med, produkt leczniczy roślinny w postaci roztworu doustnego, zawierającym suchy wyciąg z korzenia pelargonii. Stosowany jest w objawowym leczeniu przeziębienia. Pelavo Med przeznaczony jest dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat.

### Wskazania

W objawowym leczeniu przeziębienia.

### Działanie

Wspomaga w objawowym leczeniu przeziębienia.

### Dawkowanie

- Stosować doustnie.
- Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 4 ml roztworu (co odpowiada 20 mg wyciągu) 3 razy na dobę (rano, w południe, wieczorem).
- Dzieci w wieku 6-12 lat: 4 ml roztworu (20 mg wyciągu) 2 razy na dobę (rano i wieczorem).

### Skład

Substancją czynną leku jest suchy wyciąg z korzenia pelargonii (Pelargonii radicis extractum siccum).

4 ml roztworu zawiera 20 mg suchego wyciągu z Pelargonium sidoides DC i/lub Pelargonium reniforme Curt., radix (korzenia pelargonii) - Pelargonii radicis extractum siccum (4-25:1).

Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 11% (m/m).

Substancje pomocnicze:

Wyciąg: maltodekstryna

Roztwór: Glicerol (E 422), potasu sorbinian (E 202), kwas cytrynowy, guma ksantan, aromat pomarańczowomandarynkowy PHS-132958, woda oczyszczona.

#### **Przeciwwskazania**

Uczulenie na substancję czynną (wyciąg z korzenia pelargonii), na inne gatunki pelargonii oraz na inne rośliny z rodziny Geraniaceae lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

#### **Działania niepożądane**

Podczas stosowania leku obserwowano łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka, ból w nadbrzuszu, nudności, wymioty, utrudnione połykanie), łagodne krwawienia z dziąseł lub nosa oraz reakcje alergiczne. Częstotliwość występowania była bardzo rzadka (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 osób).

Odnotowano również przypadki toksycznego działania na komórki wątroby. Ich częstotliwość nie jest znana.

#### **Przechowywanie**

- W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
- Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 12 miesięcy.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

- Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
- Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
- Nie stosować z innymi produktami linii Pelavo lub zawierającymi wyciąg z korzenia pelargonii.
- Jeśli podczas stosowania leku objawy nasiliły się należy skonsultować się z lekarzem.
- Nie należy przekraczać zalecanej dobowej dawki.
- Odnotowano przypadki toksycznego działania na komórki wątroby i zapalenia wątroby podczas stosowania leku. W przypadku wystąpienia objawów hepatotoksyczności należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.
- Nie zaleca się stosowania leku u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

#### **Dodatkowe informacje**

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.