

Phlebodia 600 mg, 60 tabletek powlekanych



Cena: 74,99 zł

Opis słownikowy

Dawka	600 mg
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki powlekane
Producent	LABORATOIRES INNOTHERA
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Diosminum

Opis produktu

Wskazania

- Zmniejszenie objawów niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych (żylaki kończyn dolnych), uczucie ciężkości nóg, ból i inne dolegliwości spowodowane zespołem niespokojnych nóg zmuszające do zmiany pozycji ciała.
- Krótkotrwałe leczenie objawowe żylaków odbytu w okresie zaostrzeń dolegliwości.
- Lek przeznaczony dla osób dorosłych.

Działanie

Lek zwiększający napięcie naczyń żylnych, działa ochronnie na naczynia i zmniejsza podatność na pęknięcie małych naczyń krwionośnych.

Dawkowanie

- Niewydolność krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych: 1 tabletkę na dobę, rano na czczo.
- Zaostrzenie dolegliwości żylaków odbytu: 2 do 3 tabletek na dobę, razem z posiłkiem.
- Lek przeznaczony tylko dla osób dorosłych.
- Podawać doustnie. Połknąć tabletkę popijając odpowiednią ilością wody (pół szklanki).
- Leczenie będzie skuteczniejsze, jeżeli zostanie zastosowane łącznie ze zmianą trybu życia. Należy unikać słońca, wysokich temperatur, długiego stania, zmniejszyć masę ciała.

Skład

Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletkę zawiera 600 mg diosminy.

Pozostałe składniki to: kwas stearynowy, talk, krzemionka koloidalna bezwodna (Aerozol R 972), celuloza mikrokrystaliczna.

Otoczka:

- Substancja powlekająca Sepifilm 002: hypromeloza, celuloza mikrokrystaliczna, makrogol 400 stearynian.
- Substancja barwiąca Sepisperse AP 5523: glikol propylenowy, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124), żelaza tlenek czarny (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172).
- Opaglos 6000: alkohol etylowy 95%, guma lakowa (E 904), воск Carnauba (E 903), воск pszczeli (E 901).

Przeciwwskazania

Uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko występują działania niepożądane dotyczące zaburzeń żołądka i jelit, rzadko wymagające odstawienia produktu.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Jeśli objawy niewydolności krążenia żylnego i łamliwości włóściczek nie ustąpią w ciągu 15 dni leczenia, należy skontaktować się z lekarzem;
- Jeśli objawy dotyczące żylaków odbytu nie przeminą w ciągu kilku dni, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.
- Lek przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych (od 18 lat).
- Ciąża: lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie, jeżeli jest to konieczne oraz wyłącznie na zlecenie lekarza. Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, należy zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko on może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.
- Karmienie piersią: w związku z brakiem danych na temat przenikania leku do mleka kobiet karmiących piersią leczenie nie jest zalecane w czasie karmienia piersią.
- Lek zawiera lak czerwieni koszenilowej Ponceau 4R (E 124): może powodować reakcje alergiczne.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.